

NattoEnzym

Red rice

Hỗ trợ giảm cholesterol máu,
làm tan cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản

けつえきぎょうこぼうしゃくにほんげんりょうしょう



HIỆP HỘI
NATTOKINASE NHẬT BẢN

THÀNH PHẦN:

Hàm lượng trong 1 viên

Nattokinase ... 1000 FU

Men gạo đỏ 50 mg

Phụ liệu: Chất độn (microcrystalline cellulose M112 - INS 460 (i)), chất làm trơn (colloidal silicon dioxyd - INS 551, magnesi stearat - INS 470 (iii)).

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giảm cholesterol máu và làm tan cục máu đông, giúp cải thiện tuần hoàn máu. Hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và tắc nghẽn mạch máu.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người mỡ máu cao, có nguy cơ xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu.

Người có huyết khối gây tắc mạch máu não, mạch vành, động mạch ngoại vi.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần: sáng 1 viên, tối 1 viên.

Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 6,47 g (Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng)

Hộp 19,41 g (Hộp 1 chai x 60 viên nang cứng)

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm.

LƯU Ý:

Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, phụ nữ rong kinh, rong huyết, người dễ chảy máu hoặc có chứng máu khó đông, người bị tai biến mạch máu não do xuất huyết, chuẩn bị phẫu thuật. Thận trọng khi dùng cho phụ nữ trong giai đoạn hành kinh.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: (0292) 3891433 | Fax: (0292) 3895209

www.dhgpharma.com.vn - Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn