

PERFORMAX

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 2KCl 331,6 mg (tương đương với Glucosamin sulfat 250 mg hoặc Glucosamin base 196,3 mg), Chondroitin sulfat natri 200 mg và các tá dược gồm: Cellulose vi tinh thể, silic dioxyd dạng keo khan và magnesi stearat vừa đủ 1 viên nang.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên.

DƯỢC LỰC: PERFORMAX là sản phẩm phối hợp của 2 hoạt chất Glucosamin sulfat và Chondroitin sulfat natri. Glucosamin là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhày bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Chondroitin cũng là nguyên liệu tái tạo sụn khớp có đặc tính giúp cho mô sụn chắc và có tính đàn hồi. Sự bổ sung hai chất này ngoài giá trị dinh dưỡng cho sụn được chắc khỏe còn giúp bảo vệ sụn khớp khỏi sự phá hủy của các enzym phá hủy và các gốc tự do. Ngoài ra Chondroitin còn giúp giữ độ ẩm của mắt, tham gia các cấu trúc trong suốt đàn hồi của mắt và duy trì hoạt động sinh lý của mắt được tốt.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Viên nang cứng PERFORMAX được dùng để làm giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: Mỗi lần 2 viên, 3 - 4 lần mỗi ngày.

Cách dùng: Uống vào các bữa ăn, một đợt điều trị từ 2 - 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với Glucosamin hay Chondroitin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Tác dụng của thuốc chỉ bắt đầu sau một tuần sử dụng, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.
- Dùng thận trọng cho bệnh nhân đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu cần dùng liều lớn hơn: 20 mg/kg/ngày.
- Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tài liệu để cập đến.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Glucosamin và Chondroitin không gây tác dụng phụ trên dạ dày ruột như các thuốc chống viêm không steroid.
- Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

WHO-GMP

TOA PERFORMAX 23-D

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE

Địa chỉ: Khu A, số 18, Đường số 09, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.