

LUBIRINE

10 vỉ x 10 viên nang mềm

WHO-GMP

LUBIRINE

L-Ornithine L-Aspartate 300mg



Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa L-Ornithine L-Aspartate

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, tương tác thuốc:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Dùng gói: 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

25 đường số 8, KCN Việt Nam- Singapore, Thuận An, Bình Dương

SDX:

Số 10 SX

NSX:

HD:

10 blisters x 10 soft capsules

LUBIRINE

L-Ornithine L-Aspartate 300mg



Composition: Each soft capsule contains L-Ornithine L-Aspartate 300mg

Indications, administration, contraindications & other information: See insert paper

Storage: in a hermetic container, below 30°C, protect from light

Package: 10 blisters x 10 soft capsules

Keep out of reach of children

Read insert paper carefully before use

PHIL INTER PHARMA



**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/1/8/2014

Handwritten signature



H. THUAN AN - T. BINH DUONG

LUBIRINE

05 vỉ x 10 viên nang mềm

WHO-GMP

LUBIRINE

L-Ornithine L-Aspartate 300mg



Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa
L-Ornithine L-Aspartate 300mg

Chỉ định: Cách dùng, chống chỉ định & các
thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng

Đóng gói: 5 vỉ x 10 viên nang mềm

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sẵn với tại:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

25, đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore,

Tuần An, Bình Dương

SDK:

SỐ LỘ SX:

NSX:

HD:



05 blisters x 10 soft capsules

Composition: Each soft capsule contains
L-Ornithine L-Aspartate 300mg

**Indications, administration, contraindications
& other information:** See insert paper

Storage: In a hermetic container, below 30°C,
protect from light

Package: 5 blisters x 10 soft capsules


**Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use**

PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA



Handwritten signature: lhr





Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
L-Ornithine L-Aspartate.....300mg
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định & các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đóng gói: 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại **CTY TNHH PHIL INTER PHARMA**
25, đường số 8, KCN Việt Nam- Singapore,
Thuận An, Bình Dương

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

ellk



Composition: Each soft capsule contains:
L-Ornithine L-Aspartate.....300mg
Indications, administration, contra-indications & other information:
See insert paper.
Storage: In a hermetic container, below 30°C, protect from light.
Package: 3 blisters x 10 soft capsules

Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use

PHIL PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA



TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



LÊ THANH HIẾU

Đề xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ



LUBIRINE

SDK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: L-Ornithine L-Aspartate300mg

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, dầu đậu nành hydro hóa một phần, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, titan dioxyd, màu đỏ số 40, màu vàng số 4, màu vàng số 5, màu xanh dương số 1, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

L-Ornithine L-Aspartate là một acid amin được dùng trong điều trị bệnh tăng amoni huyết, xơ gan và bệnh não gan.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1 – 3 viên/lần x 3 lần/ngày, sau khi ăn, trong 1 - 2 tuần. Duy trì: 1 viên x 3 lần mỗi ngày trong 4 – 5 tuần tùy theo chỉ dẫn của bác sĩ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy thận nặng.

THẬN TRỌNG

Không sử dụng thuốc khi thuốc hết hạn hoặc có sự thay đổi về mùi hoặc màu sắc.

Trẻ em, người già, phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được xác định.

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

L-Ornithine L-Aspartate không có tác dụng phụ rõ ràng. Buồn nôn, nôn thoáng qua có thể xảy ra.

*** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên nang mềm. Hộp 3 vi, 5 vi, 10 vi .

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



LI PHANH HIẾU