

BXVIE0453100FL-02

HD Exp:
NSX Mfg:
Số lô SX Lot #:

• ĐAU BỤNG KINH • ĐAU RĂNG
• ĐAU NỮ ĐÀU • ĐAU DO CHẤN THƯƠNG

Acid Mefenamic 500 mg

DOLFENAL[®]



Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim

Box of 25 strips x 4 film coated tablets



DOLFENAL[®]

Mefenamic Acid 500 mg

- MIGRAINE
- MENSTRUAL CRAMPS
- DENTAL PAIN
- TRAUMATIC PAIN

Manufactured by UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD.
WHO-GMP, GLP, GSP
No.16 VSIP II, Street No.7, Vietnam-Singapore II Industrial Park,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam _ Tel: 08-39621000
[®]Registered trademark of United Laboratories, Inc.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 05/09/16

DOLFENAL Viên bao phim
Hộp 25 vỉ x 4 viên

42851155

DOLFENAL[®]

INDICATIONS

Dolfenal (mefenamic acid) is indicated in the relief of mild to moderately severe somatic and neuritic pains, headache, migraine, traumatic pain, postpartum pain, postoperative pain, dental pain, and in pain and fever following various inflammatory conditions, dysmenorrhea, and in menorrhagia accompanied by spasm or hypogastric pain.

DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE

Use for children over 12 years old and adults
Dolfenal 500 mg - One tablet, three times a day. Preferably taken with food or as prescribed by the physician. Treatment should not be continued for more than seven days.

Contraindications and other information, please refer to the package insert.

Store at temperatures not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY
BEFORE USE**



8 193602 247018 2



DOLFENAL Viên bao phim
Hộp 25 vỉ x 4 viên

DOLFENAL[®]

Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim

DOLFENAL[®]
Acid Mefenamic 500 mg

- ĐAU NỬA ĐẦU
- ĐAU BỤNG KINH
- ĐAU RĂNG
- ĐAU DO CHẤN THƯƠNG

Sản xuất tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
WHO-GMP, GLP, GSP
Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II,
Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam _ ĐT: 08-39621000
® Đăng ký nhãn hiệu United Laboratories, Inc.

DOLFENAL[®]

CHỈ ĐỊNH
Dolfenal (acid mefenamic) làm giảm các chứng đau của cơ thể và các chứng đau do thần kinh từ nhẹ đến trung bình, nhức đầu, đau nửa đầu, đau do chấn thương, đau sau sinh, đau sau phẫu thuật, đau răng, đau và sốt theo sau các chứng viêm, đau bụng kinh, chứng rong kinh kèm với đau do co thắt hay đau hạ vị.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG
Dùng cho trẻ em trên 12 tuổi và người lớn
Dolfenal 500 mg - 1 viên/ lần, 3 lần/ ngày. Nên uống trong bữa ăn hoặc uống theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Đợt trị liệu không nên kéo dài quá 7 ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số K:

UNITED INTERNATIONAL PHARMA
CÔNG TY TNHH
SỐ 16 VSIP II, ĐƯỜNG SỐ 7, KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-SINGAPORE II,
PHƯỜNG HOÀ PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

DOLFENAL Viên bao phim Foil



Tất cả thông tin về số lô SX, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nổi trong quá trình sản xuất theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2008

DOLFENAL®

Acid Mefenamic 500 mg
Viên bao phim



Đau nửa đầu - Đau bụng kinh - Đau răng - Đau do chấn thương

THÀNH PHẦN

Mỗi viên bao phim chứa:
Acid Mefenamic.....500 mg
Tá dược: Lactose Monohydrat, Calci Phosphat dibasic khan, Hydroxypropylcellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesi Stearat, Opadry vừa đủ.

MÔ TẢ

Dolfenal (acid mefenamic), dẫn xuất của acid anthranilic, là một chất kháng viêm không steroid. Chất này tương tự natri meclofenamat về mặt cấu trúc và được lý. Dolfenal (acid mefenamic) có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau, kháng viêm, chủ yếu là do ức chế sự tổng hợp prostaglandin. Giống như những thuốc kháng viêm không steroid khác, Dolfenal (acid mefenamic) ức chế sự tổng hợp prostaglandin trong mô cơ thể bằng cách ức chế enzyme cyclooxygenase, một enzyme xúc tác sự tạo thành các chất tiền prostaglandin (endoperoxid) từ acid arachidonic. Khác với các chất kháng viêm không steroid khác, nhóm fenamate gồm cả Dolfenal (acid mefenamic) cạnh tranh với prostaglandin để gắn kết với các thụ thể của prostaglandin, vì vậy chế ngự mạnh mẽ cả các prostaglandin đã được tạo thành.

Tác dụng kháng viêm

Tác dụng kháng viêm của Dolfenal (acid mefenamic) có được do ức chế sự tổng hợp và phóng thích prostaglandin trong quá trình viêm.

Tác dụng giảm đau

Tác dụng giảm đau của Dolfenal (acid mefenamic) có thể do cơ chế trung ương lẫn ngoại vi. Prostaglandin có lẽ làm nhạy cảm các thụ thể tiếp nhận cảm giác đau trước các kích thích cơ học hoặc những chất trung gian hóa học khác (như chất bradykinin, histamin). Tác dụng giảm đau của Dolfenal (acid mefenamic) có được nhờ tác động ức chế sự tổng hợp prostaglandin cũng như ngăn chặn tác động của các prostaglandin đã được tạo thành. Ngoài ra, tác dụng kháng viêm của Dolfenal (acid mefenamic) cũng góp phần vào hiệu quả giảm đau của thuốc.

Tác dụng hạ sốt

Dolfenal (acid mefenamic) làm hạ thân nhiệt bệnh nhân bị sốt. Tác dụng hạ sốt có được do ức chế sự tổng hợp prostaglandin ở hệ thần kinh trung ương (có thể là vùng dưới đồi).

CHỈ ĐỊNH

Dolfenal (acid mefenamic) làm giảm các chứng đau của cơ thể và các chứng đau do thần kinh từ nhẹ đến trung bình, nhức đầu, đau nửa đầu, đau do chấn thương, đau sau sinh, đau sau phẫu thuật, đau răng, đau và sốt theo sau các chứng viêm, đau bụng kinh, chứng rong kinh kèm với đau do co thắt hay đau hạ vị.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Dùng cho trẻ em trên 12 tuổi và người lớn
Dolfenal 500 mg - 1 viên/ lần, 3 lần/ ngày
Nên uống trong bữa ăn hoặc uống theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
Đợt trị liệu không nên kéo dài quá 7 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với acid mefenamic hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Suy chức năng gan hoặc thận.

THẬN TRỌNG

Sử dụng thận trọng đối với bệnh nhân bị loét đường tiêu hóa cấp tính.

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: các tác dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ, mờ mắt và rối loạn thị giác có thể có khi uống các thuốc kháng viêm không steroid. Nếu bị ảnh hưởng, người bệnh không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI & CHO CON BÚ

Dolfenal (acid mefenamic) chỉ nên dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết và có chỉ định của bác sĩ. Dolfenal (acid mefenamic) được bài tiết qua sữa mẹ. Vì acid mefenamic có thể gây tác dụng phụ trên hệ tim mạch của trẻ nhũ nhi, nếu cần phải dùng thuốc thì nên ngưng cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ

Cũng như những thuốc kháng viêm không steroid khác, những tác dụng phụ như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng và khó tiêu; nổi ban, mề đay, nhức đầu, chóng mặt, trầm cảm và giảm bạch cầu thoáng qua có thể xảy ra. Nó cũng có thể gây cơn hen phế quản, buồn ngủ, giảm tiểu cầu, thiếu máu tán huyết (đôi khi). Với liều cao, thuốc có thể dẫn đến động kinh cơn lớn, do đó nên tránh dùng trong trường hợp động kinh. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quả liều cấp tính dẫn đến co giật, ói mửa, tiêu chảy. Trong trường hợp này, nên làm rỗng dạ dày bằng cách gây nôn hoặc rửa dạ dày.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Dolfenal (acid mefenamic) gia tăng đáp ứng đối với các chất chống đông dạng uống. Các bệnh nhân uống thuốc này đôi khi cho kết quả dương tính khi thử nghiệm bilirubin trong nước tiểu có thể do ảnh hưởng chất chuyển hóa của thuốc lên tiến trình xét nghiệm.

TRÌNH BÀY

Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

48 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

WHO-GMP, GLP, GSP

Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt

Nam-Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Đức

Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 08-39621000

®Đang ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng