

Thuốc nhỏ mắt

Ofloxacin 0,3 %

TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ x 5 ml.

CÔNG THỨC: Cho 1 lọ 5 ml.

Ofloxacin.....15 mg

TỎ ĐƯỢC (Acid citric, Natri clorid, Dinatri hydrophosphat, Thimerosal, Nước cất).....vừa đủ

ĐƯỢC LÝ:

Được lực học:

Ofloxacin là thuốc kháng khuẩn nhóm Fluoroquinolon. Ofloxacin có phổ kháng khuẩn rộng bao gồm *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria spp.*, *Staphylococcus*, *Streptococcus pneumoniae* và một vài vi khuẩn gram dương khác.

Ofloxacin có tác dụng diệt khuẩn, cơ chế tác dụng chưa được biết đầy đủ. Giống như các thuốc Quinolon kháng khuẩn khác, Ofloxacin ức chế DNA - gyrase là Enzym cần thiết trong quá trình nhân đôi, phiên mã và tu sửa DNA của vi khuẩn

Được động học:

Thuốc nhỏ mắt có tác dụng tại chỗ nên gần như không hấp thu.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các bệnh nhiễm trùng phần ngoài mắt do vi khuẩn nhạy cảm với Ofloxacin gây ra như viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, đau mắt hột, viêm mí mắt, viêm tuyến lệ, viêm sụn mí, mụn (lẹo) mắt.

- Phòng và điều trị nhiễm trùng sau phẫu thuật mắt

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

* Các bệnh nhiễm trùng phần ngoài mắt: nhỏ 2 giọt vào mỗi mắt bị bệnh x 4 lần/ngày. Liều lượng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh nhân.

* Phòng và điều trị nhiễm trùng sau phẫu thuật mắt: 2 ngày trước khi phẫu thuật nhỏ thuốc 5 lần/ngày, mỗi lần 1 giọt. Tùy theo từng loại phẫu thuật để sử dụng thuốc cho thích hợp, nhỏ 1 giọt ngay sau khi phẫu thuật và nhỏ thuốc sau mỗi lần thay băng.

* Tham khảo ý kiến của thầy thuốc nếu đợt điều trị kéo dài trên 15 ngày.

LƯU Ý: Không dùng chung mỗi lọ cho nhiều người để tránh lây nhiễm, và không dùng quá 15 ngày sau lần mở nắp đầu tiên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Mẫn cảm với nhóm thuốc Quinolon.
- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

THẬN TRỌNG:

- Trong các bệnh cần điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nhiễm trùng bệnh viện, phải kiểm tra vi sinh học về tính nhạy cảm của các chủng vi khuẩn. Đặc biệt cần thăm dò sự đề kháng của *Staphylococcus* và *Pseudomonas* để có biện pháp điều trị thích hợp.

- Trường hợp điều trị cùng với một thuốc nhỏ mắt có chứa hoạt chất khác cần phải nhỏ thuốc cách ít nhất khoảng 15 phút.

- Chú ý tránh làm bẩn đầu ống nhỏ giọt để đề phòng nguy cơ bội nhiễm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Các phản ứng nghiêm trọng sau khi nhỏ Ofloxacin rất hiếm khi xảy ra vì có 1 phần rất nhỏ được hấp thu vào cơ thể sau khi dùng thuốc.

- Thuốc có thể gây kích ứng mắt và cảm giác kim châm tại chỗ.

- Đôi khi gây đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn thị giác, phát ban, ngứa.

- Có thể gây buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng và rối loạn tiêu hóa.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tương tác thuốc được ghi nhận khi sử dụng dưới dạng nhỏ mắt.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Có thể gây nhìn mờ khi nhỏ thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

- Cho đến nay chưa thấy báo cáo về quá liều xảy ra ở người bệnh.

- Trong trường hợp nhỏ quá liều, rửa mắt lại bằng nước ngay lập tức.

- Trong trường hợp quá liều nặng, việc điều trị triệu chứng là rất cần thiết và nên tiến hành đo nhịp tim.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Traphaco

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (84-24) 36810724/Fax: (84-24) 36811542
Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên