

Rx Thuốc bán theo đơn

**BVIT<sup>®</sup> 1 250 mg**

GMP WHO



**VIÊN NANG CỨNG**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**THÀNH PHẦN:**

Mỗi viên nang cứng chứa:

Vitamin B1 (Thiamin nitrat) ..... 250 mg

Tá dược: Tinh bột mì, Acid benzoic, Magnesi stearat.

**DẠNG TRÌNH BÀY:**

Chai 200 viên nang cứng.

**DƯỢC LỰC:**

Vitamin B1 thuộc nhóm vitamin tan trong nước - có vai trò là coenzym tham gia vào chuyển hóa glucid trong cơ thể và quá trình dẫn truyền thần kinh.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Vitamin B1 hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa. Phân phối hầu hết vào các mô. Chuyển hóa ở gan và đào thải qua thận.

**CHỈ ĐỊNH:**

Điều trị bệnh Beriberi do thiếu vitamin B1.

**THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Quá mẫn cảm với vitamin B1 và các thành phần khác của chế phẩm.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Các phản ứng có hại của vitamin B1 rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm.

**Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

TVT B0002-2



### **LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

Uống 1 viên/ lần/ ngày để điều trị bệnh Beriberi nặng, gây ra do thiếu vitamin B1.

Uống trong bữa ăn để tăng hấp thu.

### **THẬN TRỌNG:**

- **Phụ nữ mang thai:** Không có nguy cơ nào được biết. Vitamin B1 được vận chuyển tích cực vào nhau thai. Nồng độ vitamin B1 trong thai và trẻ sơ sinh cao hơn ở mẹ. Một nghiên cứu cho thấy thai có hội chứng nhiễm rượu (do mẹ nghiện rượu) phát triển rất chậm trong tử cung là do thiếu vitamin B1 do rượu gây ra.
- **Phụ nữ cho con bú:** Mẹ dùng vitamin B1 vẫn tiếp tục cho con bú được. Chỉ cần bổ sung vitamin B1 nếu khẩu phần ăn hàng ngày không đủ.
- **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái xe.

### **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Tránh dùng đồng thời với rượu khi đang điều trị.

### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Chưa có dữ liệu được ghi nhận.

### **ĐẺ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

**NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Dưới 30<sup>0</sup>C, tránh ẩm và ánh sáng.

TVT B0002-2



Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline: 1800.555.535

E-mail: [imp@imexpharm.com](mailto:imp@imexpharm.com)