



HỒ MẮT GLYCERIN 1%

# EMAS

GIỮ ẤM LÀM TRƠN DỊU MẮT

## Thành phần

Mỗi chai 12mL dung dịch thuốc có chứa:

Glycerin.....120 mg

Tá dược:

Natri clorid, Kali clorid, Borneol thiên nhiên, Acid boric, Natri borat, Pharmacoat 606,

Di-natri-edetat, Tween 80, Cồn 96<sup>o</sup>

Benzalkonium clorid,

Nước cất.....vd 12mL

## Dạng bào chế

Thuốc nhỏ mắt.

## Tính chất

Thuốc nhỏ mắt EMAS là một dung dịch đẳng trương & vô khuẩn. Tá dược thích hợp đảm bảo hoạt tính ổn định. Làm trơn, chống kích ứng thêm và giảm khô mắt.

## Các đặc tính dược lực học

Glycerin có khả năng dưỡng ẩm nhờ hấp thụ nước.

Glycerin có thuộc tính sẵn sàng hấp thụ độ ẩm, làm trơn và làm chậm bay hơi nước, do vậy đã được ứng dụng trong nhiều thuốc nhỏ mắt.

## Các đặc tính dược động học

Glycerin dễ dàng hấp thụ qua đường tiêu hóa và trải qua chuyển hóa chủ yếu ở gan. Một phần nhỏ không chuyển hóa được thải trừ qua nước tiểu.

## Chỉ định

- Làm giảm tạm thời các chứng nóng mắt, rát mắt do khô mắt gây ra.
- Làm giảm các triệu chứng khó chịu do mắt bị kích ứng khi tiếp xúc với gió, khói, bụi từ môi trường hoặc ánh sáng mặt trời.
- Làm trơn dịu mắt, bảo vệ mắt không bị kích ứng thêm.
- Làm giảm chứng mỏi mắt khi sử dụng máy vi tính.

## Liều dùng và cách dùng

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 03 tuổi trở lên

- Nhỏ 2-3 giọt vào mắt, 4-6 lần / ngày.
- Sử dụng hàng ngày.

## Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.**

## Tác dụng không mong muốn của thuốc

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

*Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*

## Tương tác với các thuốc khác

• Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác.

## Những lưu ý và cảnh báo đặc biệt

- Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai.
- Vặn chặt nắp sau mỗi lần sử dụng.  
*Trường hợp mang kính sát tròng:*
- Loại bỏ kính sát tròng trước khi sử dụng.
- Mang lại kính sát tròng sau khi sử dụng ít nhất 15 phút.

## Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Dung dịch đổi màu hoặc trở nên đục.

## Thời kỳ mang thai và cho con bú

- An toàn để sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

## Quá liều

- Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều xảy ra.

## Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên cần lưu ý đến khả năng đôi khi có thể gây nhòe mắt ngay sau khi nhỏ thuốc vào mắt.

## Bảo quản

- Để nơi khô, nhiệt độ thấp hơn 30°C, tránh ánh sáng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

## Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

- Chai mở rồi chỉ được sử dụng trong 30 ngày.

**Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCCS    SDK: VD-20198-13**



Sản xuất: Công Ty CP Dược Phẩm Hà Nội  
Lô số 15, KCN Quang Minh, Mộ Linh, Hà Nội.

Thông tin sản phẩm: Tel: 0243.511.3357

Email: [emas@ssphar.com](mailto:emas@ssphar.com)

[www.ssphar.com](http://www.ssphar.com)