



JETRY® 1% Clotrimazol 10 mg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. **Tên thuốc:** Jetry® 1%

2. **Thành phần:**

Hoạt chất: Mỗi g kem bôi da chứa Clotrimazol 10 mg

Tá dược: Polysorbat 80, parafin trắng mềm, glycerin, alcol cetylic, alcol cetostearyllic và Cetareth-30, methyl parahydroxybenzoat, nước tinh khiết.

3. **Mô tả sản phẩm:**

Kem bôi da màu trắng đến trắng hơi vàng, đồng nhất, có mùi đặc trưng.

4. **Quy cách đóng gói:**

Hộp 1 tuýp 15g kem bôi da.

5. **Thuốc dùng cho bệnh gì?**

Clotrimazol được chỉ định để điều trị tại chỗ các bệnh nấm như:

- Bệnh nấm *Candida albicans* ngoài da
- Bệnh nấm *Corynebacterium minutissimum*
- Bệnh nấm da thân
- Bệnh nấm da đầu, do *Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* (*Aerothesium floccosum*), *Microsporum canis*
- Bệnh lang ben do *Malassezia furfur*
- Bệnh nấm râu, bệnh nấm da đầu
- Bệnh nấm móng

6. **Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**

Rửa sạch vùng da bị bệnh (tốt nhất là rửa bằng xà phòng có tính kiềm), lau khô, rồi xoa một lớp mỏng thuốc, xoa nhẹ và đều cho thuốc ngấm hoàn toàn. Mỗi ngày bôi 2 – 3 lần. Thời gian điều trị trung bình từ 1- 3 tuần nếu bị lang ben, và từ 2 – 4 tuần đối với các bệnh nấm da khác.

Bệnh nhân thường đỡ trong vòng 1 tuần. Có khi phải điều trị đến 8 tuần

Để tránh tái phát, bệnh nhân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân.

7. **Khi nào không nên dùng thuốc này?**

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

8. **Tác dụng không mong muốn:**

Dùng tại chỗ: Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm nóng rát, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát vùng bôi thuốc ở da.

9. **Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc?**

Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối kháng giữa clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay flucytosin trong các loài *C. albicans*.

Nồng độ tacrolimus trong huyết thanh của người bệnh ghép gan tăng lên khi dùng đồng thời với clotrimazol. Do vậy nên giám liều tacrolimus theo nhu cầu.

10. **Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**

Bệnh nhân nên bôi tiếp trên da ngay khi nhớ ra. Nếu gần tới với thời gian bôi, bỏ qua và bôi theo như bình thường. Không bôi liên tiếp 2 lần.

11. **Cần bảo quản thuốc như thế nào?**

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Dùng thuốc trong vòng 4 tuần sau khi mở nắp.

