

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 19/.....9/.....2014

*Signature*

Batch No/Lô s.x:  
Mfg. D/NSX:  
Exp. D/HD:

Rx Thuốc bán theo đơn

Rx Prescription Drug

**Nanfizy**

**Natamycin 100mg**



Hộp 1 vỉ x 3 viên  
đạn đặt âm đạo

**Nanfizy**

**Natamycin 100mg**



Box of 1 Blister x 3  
vaginal suppositories



Thành phần: Mỗi viên chứa  
Natamycin.....100mg  
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng,  
tác dụng phụ và các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sử dụng.  
Tiêu chuẩn: NSX  
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ  
phòng không quá 30°C.  
**Để xa tầm với trẻ em**  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


Composition: Each vaginal suppository contains:  
Natamycin.....100mg  
Indication, contra-indication, dosage-administration,  
side-effect: Please see insert paper  
Specification: In-house  
Storage: At a cool, dry place, protect from light, at room  
temperature not exceed 30°C  
**Keep out of reach of children**  
Please read carefully the insert before use.

**Nanfizy**

**Natamycin 100mg**

importer/ DNNK:

**100% PANTONE 299 CVC 2X**  
**100% PANTONE Blue 072 CVC**



\*Серия и дата  
истечения срока годности  
100% PANTONE Blue 072 CVC



**R<sub>x</sub>** Thuốc kê đơn

## Viên đặt âm đạo NANFIZY

(Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ)

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:

**Hoạt chất:**

Natamycin 100 mg

**Tá dược:** Cetyl alcohol, Sorbitan trioleate, Polysorbate-80,  
Sodium hydrogen carbonate, Adipic acid, Hard fat vừa đủ 1 viên.

**Mô tả:** Viên đặt âm đạo hình trụ, màu vàng nhạt hoặc vàng be.

### Dược lực học:

Natamycin là một chất do *Streptomyces natalensis* tạo ra trong quá trình phát triển. Natamycin có tác dụng chống nấm do liên kết với các sterol ở màng tế bào nấm, làm biến đổi tính thấm và chức năng của màng, nên kali và các thành phần tế bào thiết yếu khác bị cạn kiệt. Cơ chế tác dụng này tương tự như cơ chế của amphotericin B và nystatin. In vitro, ở nồng độ 1-25 microgam/ml thuốc có thể ức chế các chủng nấm *Aspergillus*, *Candida*, *Cephalosporium*, *Curvularia*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Microsporium*, *Epidermophyton*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum* và *Sporothrix schenckii*. Nồng độ tối thiểu ức chế (MIC) hầu hết các nấm nhạy cảm là 1-10 microgam/ml. Ngoài ra, natamycin còn có tác dụng lên *Trichomonas vaginalis*. Thuốc không có tác dụng lên các vi khuẩn Gram dương, Gram âm và các virus.

Sự kháng Natamycin không gặp trong thực tế điều trị.

### Dược động học:

Thuốc ít được hấp thu vào hệ thống bởi vì thuốc hầu như không được hấp thu qua màng nhầy. Khi sử dụng dạng viên đặt dưới tác động nhiệt độ cơ thể tạo thành khối bọt, điều này đặc biệt giúp cho việc phân bố đều Natamycin trên màng niêm mạc.

### Chỉ định:

- NANFIZY được chỉ định để điều trị các bệnh nấm ở âm hộ, âm đạo, cũng như bệnh nấm *Candida*, nhiễm *Trichomonas* âm đạo.





- NANFIZY được chỉ định dự phòng nhiễm nấm lan rộng trong điều trị các tác nhân diệt khuẩn như kháng sinh phổ rộng tại âm hộ âm đạo.

**Liều lượng và cách dùng:**

Ngày 1 viên dùng 1 lần vào lúc đi ngủ, dùng 3-6 ngày liền. Tránh dùng trong thời kỳ kinh nguyệt vì trị liệu sẽ bị gián đoạn.

**Lưu ý khi sử dụng:**

- Trước khi đặt, để viên thuốc vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5-10 phút, rửa sạch âm đạo, đặt sâu vào âm đạo mỗi tối trước khi đi ngủ.
- Để có được kết quả điều trị tốt nhất, dùng ngón tay đẩy viên thuốc vào càng sâu trong âm đạo càng tốt, trong tư thế nằm ngửa.

**Chống chỉ định:**

- Bệnh nhân mẫn cảm với Natamycin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**Lưu ý đặc biệt và Thận trọng khi dùng:**

- Trong thời gian điều trị, nếu bị kinh nguyệt thì trị liệu nên gián đoạn.
- Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị nếu không đỡ cần khám lại.
- Tránh các nguồn lây nhiễm hoặc tái nhiễm.
- Khi điều trị không nhất thiết là phải tránh quan hệ tình dục. Tuy nhiên khuyến cáo xem xét (theo dõi) đối tác, trong trường hợp xuất hiện sự tổn thương do nấm, thì cần tiến hành điều trị cho đối tác.

**Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú:**

- Thời kỳ mang thai:  
Dùng được cho phụ nữ mang thai.
- Thời kỳ cho con bú:  
Thuốc có thể dùng được cho phụ nữ cho con bú vì thuốc rất ít có khả năng vào sữa mẹ.

**Ảnh hưởng tới khả năng vận hành máy móc và lái xe:**

- Không ảnh hưởng.

**Trương tác thuốc:**



- Dùng đồng thời với corticosteroid tại chỗ, có nguy cơ thúc đẩy nhiễm khuẩn lan rộng.

**Quá liều:**

Hiện nay, chưa có báo cáo về quá liều Natamycin. Tuy nhiên rất ít có khả năng quá liều vì thuốc hấp thu kém khi dùng tại chỗ.

**Phản ứng không mong muốn:**

- Các phản ứng tại chỗ như kích ứng nhẹ, cảm giác nóng rát.

*Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ xảy ra khi dùng thuốc.*

**Tiêu chuẩn chất lượng:** Tiêu chuẩn Nhà sản xuất.

**Bảo quản:**

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 30°C.

*Giữ thuốc xa tầm với trẻ em*

**Hạn dùng:**

2 năm kể từ ngày sản xuất

*Không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng.*

**Quy cách đóng gói:**

3 viên/vi, hộp 1 vi.

**Nhà sản xuất:**

**LTD FARMAPRIM**

5 Crinilor Str., village Porumbeni, Criuleni reg., MD-4829, Cộng hòa Moldova.



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Việt Hùng*