

NEOTICA BALM

Thuốc kem điều trị đau cơ khớp

Thành phần trong 100 gam

Hoạt chất

Methyl salicylat	12,50 g
Menthol	5,64 g
Camphor	1,80 g
Dầu Eucalyptol	1,80 g
Eugenol	1,36 g

Tá dược: Glyceryl monostearat, neowax SE 1726, natri lauryl sulfat, carbomer 934 P, natri hydroxyd, nước tinh khiết vừa đủ.

Dạng trình bày: Tuýp nhôm chứa 15 g, 25 g, 60 g và 100 g thuốc kem.

Tác dụng dược lý

- **Methyl salicylat** khi được thoa lên da có hiệu quả giảm đau tại chỗ.
- **Menthol** khi được thoa lên da có tác dụng làm giãn mạch, kích thích thần kinh cảm giác tiếp nhận cảm giác lạnh và ức chế thần kinh tiếp nhận cảm giác đau. Sau khi được hấp thu, menthol được bài tiết trong nước tiểu và mật.
- **Camphor** khi được dùng ngoài tác động như một chất giảm đau nhẹ, gây xung huyết da. Trong **Neotica Balm**, camphor được kết hợp với menthol sẽ kích ứng các ngọn dây thần kinh và làm mất cảm giác đau. Camphor được hấp thu tốt từ tất cả đường dùng. Camphor được chuyển hoá ở gan và đào thải theo đường nước tiểu.
- **Dầu Eucalyptol** (tinh dầu khuynh diệp) có hương thơm dịu mát làm thanh thần đầu óc và làm mát da. Khi thoa lên da, dầu khuynh diệp có tác dụng kích ứng, gây xung huyết da, đầu tiên tạo ra cảm giác ấm và đau, ngay sau đó là cảm giác tê.
- **Eugenol** cùng với dầu Eucalyptol có tác dụng gây tê tại chỗ, làm giảm cảm giác đau.

Chỉ định

Neotica Balm được chỉ định làm giảm đau, giảm sưng và kháng viêm trong chấn thương do luyện tập thể thao. Giảm đau trong đau cơ -

khớp, đau vai, đau cơ bắp, đau lưng.

Liều dùng: Thoa thuốc vào vùng bị đau, ngày 2 - 3 lần.

Chống chỉ định:

- Không dùng ở những người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không thoa lên vùng da bị trầy xước.
- Nếu đau vẫn kéo dài từ 7 đến 10 ngày hoặc vết bầm vẫn còn hay trong trường hợp dùng cho trẻ dưới 10 tuổi, phải hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Không xoa cho trẻ dưới 3 tuổi, không xoa vào vùng vú khi cho con bú, vùng niêm mạc.

Thận trọng:

- Chỉ dùng ngoài, tránh tiếp xúc với mắt.
- Nếu bị ngứa hay quá mẫn, ngưng sử dụng, thay thế bằng liệu pháp thích hợp khác.

Tương tác thuốc:

Các thuốc chống đông: Hiệu quả của thuốc chống đông được tăng cường (kéo dài thời gian thành lập thrombin) xảy ra ở nhiều bệnh nhân sử dụng đồng thời chất chống đông và methyl salicylat.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không có thông tin có ý nghĩa

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tác dụng phụ:

Nói chung, Neotica Balm được dung nạp tốt. Có thể gây kích ứng tại chỗ, đặc biệt với bệnh nhân có da nhạy cảm.

Thông báo cho nhân viên y tế những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng quá liều: Không có thông tin có ý nghĩa.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát không quá 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Nhà sản xuất



Nhà nhượng quyền

CTY TNHH THAI NAKORN PATANA Việt Nam
Km3 - Quốc lộ 1-Phường 9- TP. Tuy Hòa-Phú Yên - Việt Nam
CTY TNHH THAI NAKORN PATANA Thái Lan
94/7 Yimprakrob - Ngamwongwan - Nonthaburi - Thailand