



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx MIACOLIN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Thành phần công thức cho 1 viên

Thành phần hoạt chất: Saponin toàn phần rễ tam thất 100 mg

Thành phần tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, natri croscarmellose, PVP K30, magnesi stearat, aerosil, HPMC E606, PEG 6000, talc, titan dioxyd, erythrosin, sunset yellow.

Dạng bào chế

Viên nén bao phim.

Viên nén tròn, bao phim màu đỏ.

Tác dụng

Tăng cường tuần hoàn máu, phân tán cục máu đông, làm bền vững thành mạch, ức chế kết tập tiểu cầu.

Chỉ định

Miacolin được dùng trong các trường hợp:

- Hỗ trợ điều trị đột quy, liệt nửa người, nhồi máu não do xơ vữa động mạch và huyết khối
- Phục hồi sau tai biến mạch máu não – tim mạch
- Tắc nghẽn mạch máu võng mạc do huyết khối
- Bệnh mạch máu tim như đau thắt ngực, đau ngực

Liều dùng, cách dùng

Liều dùng

- Liều điều trị: Uống 2 viên/lần/ngày, có thể lên đến 6 viên/ngày. Một đợt điều trị kéo dài 4 tuần
- Liều dự phòng, ngăn ngừa tái phát: Uống 1 – 2 viên/ngày, liệu trình điều trị kéo dài ít nhất 4 tuần hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Cách dùng: Dùng đường uống, nuốt nguyên viên thuốc với nước

Chống chỉ định

Pha cấp của xuất huyết não, nhồi máu tim.

Dị ứng với các thành phần của thuốc.

Không dùng cho phụ nữ có thai, người đang xuất huyết, có rối loạn đông máu.



Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Trong quá trình điều trị có thể xuất hiện hiện tượng sưng đỏ hoặc sưng nhẹ ở đầu tuy nhiên tình trạng này không ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Không cần dùng thuốc nếu có nổi mẩn nhẹ, tuy nhiên cần ngừng điều trị ngay lập tức nếu có nổi mẩn trầm trọng xảy ra.

Thuốc chứa lactose, bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

Thuốc chứa sunset yellow có thể gây các phản ứng dị ứng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ mang thai.

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Không nên lái xe hoặc làm việc ở trên cao trong thời gian sử dụng thuốc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chưa có ghi nhận nào về tương tác thuốc cũng như các dạng tương tác khác.

Tác dụng không mong muốn

Khô họng, đỏ mắt, đánh trống ngực, nổi mẩn có thể xảy ra và sẽ hết sau khi ngừng điều trị.

Rất hiếm xảy ra phản ứng quá mẫn.

Quá liều và cách xử trí

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Qui cách đóng gói

Hộp 3 vi, 5 vi, 10 vi x 10 viên, vi PVC/nhôm

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất

Sản xuất tại: Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: Nhà máy sản xuất - Lô B3, Khu Công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Tên, địa chỉ nhà phân phối

Nhà phân phối: Công ty TNHH công nghệ dược Minh An

Địa chỉ: Số 19D-TT5, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243 855 2490



TU QUẢN LÝ DƯỢC
TU QUẢN LÝ DƯỢC
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



GIÁM ĐỐC
Lương Thị Mai Hương

