

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUẢNG CÁO THUỐC**

**Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc số: **01/2015**

Của: **Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương**

Địa chỉ: **102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương**

Điện thoại: **0320 3853848**

Đăng ký quảng cáo thuốc: **Ceginkton**

Hình thức quảng cáo thuốc: **Trên poster, bảng, biển, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy tiếp nhận: **0338/15/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **28/07/2015**

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

**KT. CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Đỗ Văn Đông**

28/7



# CEGINKTON®

## HOẠT HUYẾT - DƯỠNG NÃO



# CEGINKTON®

## HOẠT HUYẾT - DƯỠNG NÃO

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

- Cao đặc Đinh lăng 1/10 ..... 250 mg
- (tương đương với 2500 mg Đinh lăng (Radix Polysciacis))
- Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) ..... 100 mg
- Tà dược: (Dầu đậu nành, dầu cò, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin, nipagin, nipasol, titan dioxide, ethyl vanillin, dung dịch sorbitol 70%, màu Brown R)...vừa đủ 1 viên.

### CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh sau:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người đang chảy máu

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày.
- Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

*Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Uống 1 viên/lần, ngày uống 2 - 3 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 1 viên.

### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHILAI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

### SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:

Không dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết.

### QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bôn chôn. Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

### HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

### BẢO QUẢN:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

### TIÊU CHUẨN:

Đạt TCCS

### TRÌNH BAY:

Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên.

- KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH.

- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

- BẾ XA TÂM TAY TRẺ EM. NEU CẦN THÊM THÔNG TIN HỜI Y KIẾN BÁC SỸ.



*ly28/07/2015*