

SĐT 14 8, 0102

bso
28599



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
20-03-2019
Lần đầu:...../...../.....

Nhãn lọ



Nhãn phụ

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đề xa tầm tay trẻ em.
Thuốc dùng ngoài.*

Tên thuốc: **Remowart**
Hoạt chất: Acid salicylic 167 mg/g
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Sản phẩm dễ cháy. Tránh xa lửa hoặc nguồn nhiệt.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
Cơ sở sản xuất: Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Địa chỉ: Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Nova, 3150-194, Bồ Đào Nha
DNNK:.....
SDK:.....;
Số lô SX:.....; NSX: dd/mm/yyyy ; HD: dd/mm/yyyy

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ HDSĐ thuốc kèm theo



REMOWART

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thuốc dùng ngoài.

THÀNH PHẦN:

Mỗi lọ 10 ml dung dịch Remowart chứa:

Thành phần hoạt chất: 1,509 g acid salicylic.

Thành phần tá dược: Acid lactic và flexible methylated collodion.

DẠNG BẢO CHẾ

Dung dịch bôi ngoài da trong suốt, màu vàng nhạt đến nâu vàng, có mùi ether.

CHỈ ĐỊNH

Remowart được chỉ định trong điều trị tất cả các loại mụn cóc như mụn cóc thông thường, mụn cóc phẳng, mụn cóc ở trẻ em và mụn cóc ở chân, điều trị chai chân và chai sần trên da.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Remowart chỉ dùng NGOÀI DA.

Trước khi sử dụng Remowart, ngâm vùng da bị ảnh hưởng trong nước ấm khoảng 5 phút và lau sạch bằng khăn.

Chỉ sử dụng Remowart tại trung tâm của vùng da bị ảnh hưởng, cẩn thận không để thuốc tiếp xúc với vùng da lành xung quanh (nếu cần thiết, bôi một lượng nhỏ kem mỡ lên xung quanh vùng da được điều trị, để bảo vệ vùng da này không tiếp xúc với thuốc). Bỏ giọt đầu tiên hoặc giọt thứ hai vì những giọt này thường lớn hơn.

Chỉ nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào vùng da bị ảnh hưởng và để tự khô trong vài phút cho đến khi một màng bao mềm được hình thành.

Sau đó, băng vùng điều trị bằng dải băng vết thương và để cho thuốc hoạt động trong 24 giờ, tránh tiếp xúc với nước.

Sau 24 giờ, tháo băng, rửa với nước ấm để loại bỏ các màng Remowart, và sau đó chà xát cẩn thận vào vùng điều trị bằng dụng cụ mài mòn da thích hợp (đá bọt hoặc mài da).

Lặp lại việc điều trị hàng ngày cho đến khi mụn cóc hoặc chai chân biến mất hoàn toàn, có thể mất một thời gian khá dài (6-12 tuần). Tuy nhiên, nếu da bị kích ứng, ngừng sử dụng hai hoặc ba ngày cho đến khi không còn bị viêm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bị bệnh tiểu đường hoặc có vấn đề về tuần hoàn máu.

Trẻ em dưới 2 tuổi.

Không sử dụng sản phẩm với mụn cóc trên mặt, mụn cóc có lông hoặc mụn cóc sinh dục; không sử dụng ở vùng da bất thường hay các dấu vết bẩm sinh.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Remowart chỉ dùng NGOÀI DA.

Tránh tiếp xúc với vùng da lành xung quanh. Trường hợp có tiếp xúc và kích ứng xảy ra, ngừng sử dụng các sản phẩm thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tránh tiếp xúc với mắt và màng nhầy. Nếu xảy ra tiếp xúc, rửa kỹ với nước, loại bỏ collodion kết tủa sau đó rửa sạch lại với nước thêm 15 phút nữa.

Sử dụng khăn riêng vì mụn cóc có lây nhiễm.

Tránh tiếp xúc với quần áo, nhựa, gỗ, kim loại và các vật liệu khác vì có thể bị làm hỏng bởi dung dịch.



Remowart dễ cháy, nên sử dụng cách xa nguồn nhiệt.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Giống với các sản phẩm thuốc khác, nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hỏi bác sĩ để được tư vấn trước khi tiến hành điều trị.

ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không áp dụng.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC

Chưa biết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Triệu chứng kích ứng có thể xảy ra, đôi khi kèm theo cảm giác nóng rát và đóng vảy. Trong những trường hợp này, ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Dùng Remowart cho một vùng da lớn, tại mức liều cao, hoặc dùng kéo dài, có thể gây ra các triệu chứng kích ứng đôi khi kèm theo cảm giác nóng rát và đóng vảy. Trong những trường hợp này, ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc tróc lớp sừng da, điều trị mụn cóc

Mã ATC: D11AF

Remowart là dung dịch ngoài da có chứa hoạt chất acid salicylic, và có tá dược là acid lactic và flexible methylated collodion. Sản phẩm dễ sử dụng và có khả năng tróc lớp sừng mạnh.

Acid salicylic có tác dụng tróc lớp sừng mạnh và tác động sát trùng trung bình khi bôi lên da. Acid salicylic làm mềm và phá hủy lớp sừng bằng cách tăng hydrat hóa nội sinh, có thể do làm giảm pH, làm mềm và bong lớp sừng. Độ ẩm là cần thiết cho hoạt động của acid salicylic trên da cũng để làm lột và bong tróc mô biểu bì. Salicylic acid có hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn yếu.

Salicylic acid được sử dụng rộng rãi cùng với acid lactic và flexible collodion trong việc điều trị mụn cóc.

Việc điều trị không gây đau và bệnh nhân có thể tự điều trị.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Salicylic acid được hấp thu nhanh chóng qua da và bài tiết chậm qua thận.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ 10 ml.

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 30°C. Sản phẩm dễ cháy. Đóng chặt nắp lọ, tránh xa lửa hoặc nguồn nhiệt.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

NHÀ SẢN XUẤT

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, SA.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Nova, 3150-194, Bồ Đào Nha.

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Vân Hạnh