

Hướng dẫn sử dụng

Nhũ tương nhỏ mắt DTP-Relaxx 4+

Giới thiệu:

DTP-Relaxx 4+ chứa Ciclosporin một chất điều hòa miễn dịch polypeptit vòng có đặc tính ức chế miễn dịch, Ciclosporin cũng đã được chứng minh có tác dụng chống viêm. Ciclosporin có khả năng ức chế sản xuất và/hoặc giải phóng các cytokin gây viêm, bao gồm interleukin 2 (IL-2) hoặc yếu tố tăng trưởng tế bào T (TCGF). Nó cũng được biết đến để điều chỉnh việc giải phóng các cytokin chống viêm.

Ở những bệnh nhân bị bệnh khô mắt, một tình trạng có thể được coi là có cơ chế miễn dịch viêm, sau khi dùng sản phẩm, ciclosporin được hấp thu thụ động vào tế bào lympho T ở giác mạc và kết mạc làm bất hoạt men calcineurin phosphatase.

Sự bất hoạt calcineurin do ciclosporin gây ra ức chế sự khử phosphoryl của yếu tố phiên mã NF-AT và ngăn cản sự chuyển vị NF-AT vào nhân, do đó ngăn chặn việc giải phóng các cytokin gây viêm như IL-2. Từ đó **DTP-Relaxx 4+** giúp giảm viêm giác mạc nặng ở bệnh nhân khô mắt.

Ngoài ra **DTP-Relaxx 4+** được bào chế dựa trên công nghệ nhũ tương **Nano droplet™ technology**, do đó **DTP-Relaxx 4+** thuộc nhóm nước mắt nhân tạo thế hệ 4, cung cấp lớp lipid cho mắt, giúp giảm bay hơi nước, chống khô mắt hiệu quả hơn các dòng nước mắt thông thường. **DTP-Relaxx 4+** không chứa chất bảo quản có thể sử dụng dài ngày.

Thành phần:

Ciclosporin 0,05%; Glycerin, Dầu thầu dầu, Polysorbate 80, Carbomer, nước tinh khiết vừa đủ.

Quy cách đóng gói:

Hộp 10 ống x 0,4 ml; Hộp 20 ống x 0,4 ml;
Hộp 10 ống x 1,0 ml; Hộp 20 ống x 1,0 ml

Công dụng:

Tăng sản sinh nước mắt ở bệnh nhân được xem là mất khả năng sản sinh nước mắt do viêm mắt liên quan đến viêm khô kết mạc.

Viêm giác mạc nặng ở người lớn bị bệnh khô mắt, không cải thiện mặc dù đã điều trị bằng sản phẩm thay thế nước mắt.

Khô mắt sau mổ phẫu thuật mắt (ví dụ: phẫu thuật khúc xạ, phẫu thuật đục thủy tinh thể, ghép giác mạc).

Đối tượng không sử dụng:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi sử dụng.

Nhỏ một giọt **DTP-Relaxx 4+** vào mỗi mắt 2 lần mỗi ngày cách khoảng 12 giờ.

DTP-Relaxx 4+ có thể sử dụng đồng thời với nước mắt nhân tạo khác với khoảng cách 15 phút giữa 2 sản phẩm.

Cách sử dụng



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở

Lắc kỹ trước khi sử dụng. Vặn nắp rời ống và giữ sạch đầu nắp

Giữ ống gần nhưng không chạm vào mắt và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt.

Đậy nắp lại cho lần sử dụng sau

Lưu ý:

Viêm khô kết mạc - giác mạc là một bệnh mãn tính. Bệnh nhân cần được tư vấn, không nên ngừng điều trị sớm.

Rửa và lau khô tay thật kỹ

Trước khi sử dụng, phải đảm bảo ống còn nguyên vẹn

Lấy một ống nhũ tương và lắc trước khi sử dụng

Xoáy đầu ống để mở

Tránh để đầu ống tiếp xúc với mắt

Không sử dụng nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn **DTP-Relaxx 4+** nếu ống bị hư hỏng.

Đậy nắp kín sau khi sử dụng

Lưu trữ dưới 30°C. Không đóng đá.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 2 ngày kể từ khi mở nắp.

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Mặt 1



Mặt 2