

Sirô ho THEPHARM

Tiêu chảy - chống co thắt - giảm ho

Công thức: Cho 60 ml thành phẩm:
Cao khô lá thường xuân (*Extractum hederæ helix*) 0,42 g

(Tương đương 6,72 gam lá thường xuân)

Tá dược: Gôm xanthan, acid citric, sorbitol, methylparaben, propylparaben, nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Sirô thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml. Hộp 1 chai x 70ml. Hộp 1 chai x 90ml. Hộp 1 chai x 100ml. Hộp 1 chai x 120ml.

Chỉ định:

- Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho.
- Dùng điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

Chống chỉ định:

- Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, chỉ được phép dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Thận trọng:

Bởi vì tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

Tương tác thuốc: Không có phản ứng không mong muốn nào được biết đến khi sử dụng đồng thời đường uống Sirô ho Thepharm với các loại thuốc khác. Vì vậy, sử dụng Sirô ho Thepharm đồng thời với các thuốc khác được xem là an toàn, ví dụ như phối hợp với thuốc kháng sinh.

Tác dụng không mong muốn: Rất hiếm gặp, nhưng thuốc có thể dẫn tới nhuận tràng do trong thuốc có thành phần sorbitol.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng và cách dùng: Sử dụng dụng cụ đong thuốc đi kèm trong hộp thuốc:

Nếu không có chỉ định riêng, sử dụng liều như sau:

- Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 1 - 5 tuổi: 2,5 ml x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: 5ml x 3 lần/ngày.
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 5 - 7,5 ml x 3 lần/ngày.

Lắc kỹ trước mỗi lần dùng

Thời gian điều trị:

- Thời gian điều trị ho phụ thuộc vào loại bệnh và mức độ của bệnh trên lâm sàng, tuy nhiên, việc điều trị nên duy trì trong ít nhất một tuần đối với trường hợp viêm nhẹ đường hô hấp. Việc điều trị với Sirô ho Thepharm nên được duy trì 2 - 3 ngày sau khi hết triệu chứng để đảm bảo hiệu quả của đợt điều trị.

Nếu tình trạng bệnh vẫn kéo dài hoặc có xuất hiện thờ nóng, sốt cũng như đờm có máu hoặc mủ thì phải tham khảo ngay ý kiến bác sĩ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Nên thận trọng, chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc:

Sử dụng được.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:

- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

- Sirô ho Thepharm được chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)



thephaco

Nhà sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc đông dược

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3737888 - Hotline: 1800 8140