

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ECKHART Q10

Thành phần:

Mỗi viên có chứa Coenzym Q10: 30mg

Tá dược: Rice Bran Oil, Gelatin, Vitamin E, Glycerin, Beeswax, Titanium dioxide, Annato.

Chỉ định điều trị:

Điều trị các triệu chứng liên quan tới suy tim xung huyết thể nhẹ và vừa ở những bệnh nhân đang theo chế độ điều trị chuẩn.

Liều lượng và cách dùng:

Liều thường dùng cho người lớn: uống mỗi lần 1 viên nang mềm mỗi ngày sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Không có chống chỉ định với Coenzym Q10.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Tiêu hóa: đau dạ dày nhẹ, chán ăn, buồn nôn hoặc ỉa chảy nhưng không thường xuyên xảy ra.

Mẫn cảm với thuốc: triệu chứng như nổi ban da xảy ra nhưng không thường xuyên.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có báo cáo nào về Coenzym Q10 gây ra dấu hiệu tương tác với thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không thấy báo cáo Coenzym Q10 gây quái thai. Trên lâm sàng, độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai chưa xác định.

Dược lý học:

Coenzym Q10 tác dụng nâng cao hiệu suất sử dụng oxy trong hội chứng suy tim thiếu máu cục bộ: Thí nghiệm trên cơ thỏ chuột lang cho thấy Coenzym Q10 làm tăng lực cơ khi giảm oxy không khí thở vào sử dụng cách truyền dung dịch Tyrode, cũng như giảm thời gian thể tác động trong tình trạng giảm oxy không khí thở vào.

Kích hoạt tổng hợp ATP ở ty lạp cơ thể tim

Thí nghiệm trên chó cho thấy Coenzym Q10 điều chỉnh kiểm soát quá trình hô hấp và tổng hợp ATP liên quan tới thiếu máu cục bộ và tái truyền và tăng tổng hợp ATP trong thí nghiệm trên tim thỏ và chuột cống.

Cải thiện chức năng tim đã bị giảm:

Thí nghiệm trên chuột cống, Coenzym Q10 ức chế giảm cơ cơ tim do thiếu máu cục bộ và tái tưới máu và thúc đẩy chức năng tim đã bị suy yếu.

Bảo vệ cơ tim:

Coenzym Q10 có tác dụng chống oxy hóa và làm bền màng tế bào, người ta đã phát hiện được thuốc có tác dụng hạn chế sự hủy hoại cơ tim của doxorubixin hydrochlorid trên chuột cống. Thuốc cũng ức chế phóng thích men cơ tim vào máu do thiếu máu cục bộ thực nghiệm trên chó.

Tác dụng chống aldosteron:

Thí nghiệm trên chuột cống cho thấy Coenzym Q10 ức chế tiết aldosteron và đối kháng lưu giữ Na^+ của aldosteron, làm cho tăng bài tiết Na^+ . Tuy nhiên, Coenzym Q10 không có tác dụng trên bài tiết K^+ .

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ $< 30^\circ\text{C}$

Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất

Quy cách đóng gói: lọ 30 viên

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để thuốc ngoài tầm với của trẻ em

Trong thời gian điều trị nếu xảy ra phản ứng không mong muốn nào, hãy thông báo cho thầy thuốc biết.

Tên và địa chỉ nhà sản xuất: ECKHART CORPORATION

2410 West Zion Road, Salisbury, Maryland 21801, Mỹ.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh