

silicolgel®

Colloidal Silicic Acid
dùng cho các rối loạn tiêu hóa

Điều trị

- Chứng ợ nóng
- Trào ngược
- Nôn mửa

Và hội chứng ruột kích thích (IBS)

- Buồn nôn
- Đầy hơi
- Đau bụng
- Các khó chịu ruột
- Tiêu chảy

silicolgel chứa axit silicic là một hợp chất của khoáng chất silic và oxy ở dạng keo (có khả năng phân tán cao) và ngậm nước.

Silicon là nguyên tố phổ biến thứ hai trên trái đất, sau oxy. Được tìm thấy trong tự nhiên như silicon dioxide và ở dạng ngậm nước hoặc nước như axit silicic.

Rối loạn tiêu hóa thường do các chất kích thích gây ra và các chất có hại và độc hại cũng như các tác nhân gây bệnh.

Khi đường tiêu hóa bị rối loạn bởi các chất độc và mầm bệnh, nó có thể dẫn đến các rối loạn như ợ nóng, ợ mửa và nôn mửa cũng như buồn nôn, đau bụng, khó chịu ruột, tiêu chảy và đầy hơi có thể là triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS).

Kết quả là, đường tiêu hóa không thể hoạt động bình thường và điều này có thể dẫn đến khó chịu về thể chất.

Ưu điểm của **silicolgel** tồn tại ở bề mặt lớn và có tính phản ứng cao của axit silicic.

Khi hấp thụ vào bên trong, nó tạo thành một lớp phủ bảo vệ và làm dịu trên lớp niêm mạc dạ dày và ruột.

Do tính chất bám dính hoặc bám dính của colloidal silicic acid, nó hấp thụ vật lý hoặc liên kết hầu hết các chất kích thích và các chất có hại và độc hại cũng như các tác nhân gây bệnh.

Điều này làm cho chúng vô hại để chúng có thể được loại bỏ một cách tự nhiên thông qua ruột và ra khỏi cơ thể.

Axit silicic cũng có thể liên kết khí và giảm độ axit dư thừa. Điều này có thể làm giảm đầy hơi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

• Lắc đều trước khi sử dụng.

- Uống silicolgel với khoảng cách ít nhất 1 giờ trước hoặc sau khi uống thuốc khác.

Để điều trị rối loạn tiêu hóa, uống 1 muỗng canh (15ml) **silicolgel** ba lần mỗi ngày và trước bữa ăn một giờ.

silicolgel chỉ nên được sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi theo lời khuyên của bác sĩ.

silicolgel có thể được pha loãng với nước để uống.

Sau khi hết các triệu chứng cấp tính, việc điều trị bằng **silicolgel** có thể tiếp tục trong vài ngày nữa.

silicolgel cũng làm giảm bớt các triệu chứng tương tự ở đường tiêu hóa có thể xảy ra do thay đổi chế độ ăn uống trong thời gian đi lại hoặc vào kỳ nghỉ.

Nếu các triệu chứng cấp tính xấu đi hoặc không thuyên giảm sau ba ngày, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Với tiêu chảy, nó cần thiết để thay thế lượng nước bị mất đi. Trong các rối loạn mãn tính, điều trị trong tối đa 4 tuần.

silicolgel thích hợp cho người ăn chay và thuần chay. Không chứa gluten.

THÀNH PHẦN:

3,5 g Silicon dioxide trong 100 ml axit Silicic gel, Chất bảo quản: axit Sorbic (E 200), Sodium benzoate (E 211).

TÁC DỤNG PHỤ:

Không có tác dụng phụ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Nên uống **silicolgel** với khoảng cách ít nhất 1 giờ trước hoặc sau khi uống các loại thuốc khác. Nếu không, hiệu quả của thuốc có thể bị suy giảm bởi khả năng liên kết của axit silicic.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không sử dụng **silicolgel** trong trường hợp quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào.

THẬN TRỌNG:

- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không làm đông. Bảo quản trên 2 ° C.
- Lắc đều trước khi sử dụng.
- Đọc kỹ tờ hướng dẫn trong hộp trước khi sử dụng
- Chỉ sử dụng cho đến ngày hết hạn.
- Sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở.

LOẠI SẢN PHẨM:

Gel dùng để uống.

ĐÓNG GÓI:

Chai 200 ml hoặc 500 ml

TÌNH TRẠNG THÔNG TIN:

Tờ rơi sửa đổi lần cuối tháng 3 năm 2019.



SẢN XUẤT TẠI ĐỨC:

Silicol GmbH, Teltower Strasse 10, D-33719 Bielefeld

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM:

Công Ty TNHH Chăm Sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam
Địa chỉ: 40/19 Đường Bàu Cát 2, Phường 14
Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 028 - 62963822

