

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc chỉ dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Kem bôi da **FLUCORTTM-N**



Thành phần:

Fluocinolone acetonide BP 0.025%

Neomycin Sulphate BP 0.5%

(tương đương 0.35% Neomycin bazơ)

Kem không nhờn vữa.

Tá dược: Parafin mềm trắng, Paraffin lỏng, Cetomacrogol 1000, Cetostearyl Alcohol, Propylene Glycol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Natri Phosphate khan, Natri Dihydro Phosphate, Nước tinh chế.

Fluocinolone acetonide là một dẫn xuất Hydrocortisone tổng hợp, có Fluorine gắn vào vị trí số 9 của nhân steroid làm tăng cường hoạt tính lên nhiều lần

FLUCORT-N chứa Fluocinolone acetonide là corticosteroid có hoạt tính mạnh nhất trong tất cả các corticosteroid dùng ngoài da, được kết hợp với kháng sinh Neomycin dùng để điều trị các bệnh viêm da có kèm nhiễm khuẩn.

Bảng sau đây cho thấy sự so sánh giữa các corticosteroid khác nhau:

Steroids	Hoạt lực	Hàm lượng dùng trong da liễu
Hydrocortisone	1	1.00%
Prednisolone	2	0.50%
Triamcinolone acetonide	10	0.10%
Betamethasone valerate	10	0.10%
Flurandrenolone	20	0.02%
Fluocinolone acetinide	40 - 100	0.01% - 0.025%

Chỉ định:

FLUCORT-N được chỉ định để điều trị các bệnh viêm da, kể cả đối với các trường hợp nặng và không có hiệu quả với những corticosteroid thoa ngoài da khác. Chỉ định bao gồm chàm dị ứng, chàm sữa, bệnh ngứa sần Besnier, chàm dạng đĩa, chàm do giãn tĩnh mạch, vẩy nến, viêm da tiết bã, viêm da tiếp xúc, viêm da thần kinh, Lupus ban đỏ, ban đỏ đa dạng, viêm da mủ, chốc lở, viêm tai ngoài, ngứa vùng hậu môn-sinh dục và ngứa do lão suy.

Nên dùng **kem FLUCORT-N** khi có hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn.

Kem FLUCORT-N rất thích hợp trong điều trị những bệnh ở da vùng nếp gấp hay rậm lông.

Liều lượng và hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngoài da đơn thuần:

Khi thoa tại chỗ thì corticosteroid có hiệu quả kéo dài không quá 6-8 giờ. Đối với những trường hợp cấp thường phải thoa 3 lần/1 ngày, còn trong những bệnh da mãn thường chỉ thoa 1 lần là đủ. Do Flucort-N chứa một corticosteroid rất mạnh, khuyên chỉ nên bôi một lớp mỏng vừa đủ.

Sử dụng cho vùng da cần băng kín bằng băng plastic.

Rửa sạch và sát trùng da. Bôi một lượng nhỏ kem và xoa bóp. Sau đó, thoa một lớp kem mới nhưng không xoa bóp. Băng chặt vùng da có thuốc bằng một băng plastic. Đối với da khô hoặc có vảy nên để một miếng gạc ẩm giữa vùng da có thuốc và băng plastic. Nên tháo băng và rửa sạch ít nhất một lần trong vòng 24 giờ.

Chống chỉ định:

Nhiễm khuẩn nguyên phát ở da do vi khuẩn, vi nấm và virus. Cũng như tất cả các corticosteroid dùng tại chỗ khác, không được dùng trong bệnh lao da, thủy đậu, herpes simplex, sởi, đậu mùa, loét da do giang mai và các bệnh nhân bị mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

Nếu dùng Flucort-N khi có nhiễm khuẩn, phải điều trị nhiễm khuẩn bằng một kháng sinh thích hợp. Dùng tại chỗ các thuốc Steroid liên tục và lâu dài có thể gây teo da. Không bôi các thuốc Steroid lên vùng mặt trong thời gian dài. Dùng lâu dài các thuốc

Steroid tại chỗ có thể hấp thu thuốc đủ để gây ra các triệu chứng ức chế tuyến thượng thận.

Tác dụng bất lợi: Có thể xảy ra cảm giác rát bỏng, ngứa, kích ứng, khô da, viêm nang lông, rậm lông, mụn trứng cá, giảm sắc tố da, viêm da quanh miệng, viêm da tiếp xúc dị ứng, da bị chà xát, nhiễm khuẩn thứ cấp, teo da, vằn da, ra mồ hôi trộm.

Chú ý “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

Sử dụng trong khi mang thai: Không được bôi lượng lớn thuốc và dùng kéo dài trong thời gian mang thai. Chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Dạng trình bày: Tuýp 15g.

Bảo quản: Bảo quản ở nơi mát, nhiệt độ phòng, tránh để đông lạnh và tiếp xúc ánh sáng.

Tiêu chuẩn: USP

VISA NO.: VN-11881-11

Sản xuất bởi:

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Plot No. E 37, 39, MIDC Area, Satpur,

Nasik 422 007, Maharashtra, INDIA

™ Trade Mark