

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên đặt âm đạo

Fuginata

SUP 100 mg

Giới thiệu:

Fuginata Sup 100 mg có tác dụng chống nấm do liên kết với các sterol ở màng tế bào nấm làm biến đổi tính thấm và chức năng của màng, do vậy làm mất Kali và cạn kiệt các thành phần thiết yếu, từ đó loại bỏ tế bào nấm.

Fuginata Sup 100 mg có tác dụng trên các chủng nấm *Aspergillus*, *Candida*, *Cephalosporium*, *Curvularia*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Microsporium*, *Epidermophyton*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum* và *Sporothrix schenckii*.

Fuginata Sup 100 mg an toàn cho phụ nữ có thai và đang cho con bú do Natamycin có tác dụng tại chỗ, không hấp thu qua niêm mạc âm đạo.

Thành phần:

Natamycin 100mg, Cetyl alcohol, Span 80, Hard fat vừa đủ 1 viên.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ 6 viên

Công dụng:

Sử dụng trong các bệnh nấm ở âm hộ, âm đạo cũng như bệnh nấm *Candida*, nhiễm *Trichomonas*...âm đạo, âm hộ.

Sử dụng dự phòng nhiễm nấm lan rộng do các tác nhân diệt khuẩn như kháng sinh phổ rộng tại âm đạo.

Hướng dẫn sử dụng:

Ngày 1 viên dùng 1 lần vào lúc đi ngủ, dùng 3-6 ngày liên tiếp. Rửa sạch âm đạo, đặt vào âm đạo mỗi tối trước khi đi ngủ.

Cách sử dụng thanh đẩy:



1 Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng.



2 Bóc viên đặt, để vào phần đầu của thanh đẩy.



3 Giữ tư thế thoải mái như đứng, ngồi xổm, cúi người về phía trước bằng thắt lưng, đứng nâng một chân lên ghế hoặc nằm với cẳng chân hơi gấp lại.

Đưa thanh đẩy vào âm đạo sâu khoảng 2-3 cm, ấn pittong nhẹ nhàng đẩy viên đặt vào âm đạo.



4 Vệ sinh thanh đẩy bằng nước sôi sau khi sử dụng, để khô. Bảo quản nơi khô ráo.



Chú ý: Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh sau 10 phút.

Đối tượng không sử dụng:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

+ **Thời kỳ mang thai:** **Fuginata Sup 100 mg** tác dụng tại chỗ, không hấp thu được qua niêm mạc âm đạo nên dùng được cho phụ nữ có thai.

+ **Thời kỳ cho con bú:** **Fuginata Sup 100 mg** có thể dùng cho phụ nữ cho con bú vì không có khả năng hấp thu vào sữa mẹ.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội