

Hướng dẫn sử dụng

Mogarna

KEM BÔI GIẢM ĐAU TRỊ

cream

Giới thiệu:

Kem bôi giảm đau trị Mogarna cream được sử dụng tại chỗ. Kem có chứa các thành phần giúp làm dịu, mát, giảm viêm, sưng, đau, ngứa rát và nứt hậu môn, đặc biệt trong trường hợp bị trĩ, táo bón. Mogarna cream cũng tạo một lớp phủ, bảo vệ bề mặt và giúp đi vệ sinh đỡ đau hơn, cắt đứt vòng xoắn bệnh lý táo bón – trĩ và giúp co búi trĩ.

Thành phần:

Rutin, Lidocain, Phenylephrin hydrochlorid, Vitamin E acetat, Amoni glycyrrhizinat, Allantoin, Menthol, Glycerin, Vaseline trắng, Propylen glycol, Stearic acid, Cetyl alcohol, Natri lauryl sulfat, Citric acid, Natri citrat, methyl parahydroxybenzoat, propyl parahydroxybenzoat, Suppocire BSX, Nước tinh khiết vừa đủ 1 tuýp.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 tuýp 15 gam

Công dụng-đối tượng:

Kem bôi giảm đau trị Mogarna cream được sử dụng trên đối tượng:

- Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp.

- Nứt kẽ hậu môn.

- Người bị táo bón, đau, chảy máu khi đi vệ sinh.

Khuyến cáo cho đối tượng từ 2 tuổi trở lên.

Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Hướng dẫn sử dụng:

- Giảm đau, chảy máu khi đi vệ sinh: bôi vào trong hậu môn và/hoặc bôi bên ngoài trước khi đi vệ sinh 5 phút.

- Trĩ ngoại, nứt hậu môn: Bôi trực tiếp lên phần bị viêm, sưng hoặc bôi lên vùng da ở hậu môn, 1-3 lần/ngày sau khi đã làm sạch và lau khô. Có thể dùng cùng băng gạc.

- Trĩ nội: bôi vào trong hậu môn 1-2 lần/ngày sau khi đi vệ sinh và làm sạch, lau khô xong.

Sử dụng liên tục trong thời gian không quá 10 ngày.

Có thể phối hợp cả 3 cách sử dụng trên mà không cần điều chỉnh lượng dùng.

Thận trọng và cảnh báo:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 6 tháng kể từ khi mở nắp.

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội

T2-22-260623-T03034-D00001