

Bozypaine®

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén ngậm có chứa:

- Hoạt chất: Cetylpyridinium clorid1,5 mg
- Tá dược: Natri saccharin, magnesi stearat, tinh dầu bạc hà, sorbitol.

MÔ TẢ

- Viên nén tròn, màu trắng, một mặt trơn, một mặt có khắc chữ BOSTON, cạnh và thành viên lành lặn.

TÍNH CHẤT

- Cetylpyridinium clorid là một chất sát khuẩn thuộc nhóm pyridinium thế hệ 4, có tác dụng giống như một chất hoạt động bề mặt cation. Thường được sử dụng dạng viên ngậm hoặc dung dịch dùng ngoài.
- Là một chất có tác dụng kháng khuẩn, có tác dụng điều trị nhiễm trùng bề mặt của miệng và họng.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc chỉ dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi với các chỉ định sau:

- Đau và viêm họng nhẹ (không có sốt).
- Áp tơ, thương tổn nhỏ trong miệng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Cách dùng:

- Dùng đường miệng bằng cách ngậm để viên thuốc tan từ từ trong miệng.
- Nên dùng thuốc với các khoảng đều đặn trong ngày, khoảng cách giữa 2 lần ít nhất là 2 giờ.

Liều dùng:

- Liều dùng thông thường là 3 - 6 viên mỗi ngày.
- Không nên sử dụng thuốc quá 5 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

- Không nên dùng thuốc dài ngày (quá 5 ngày), do thuốc có thể gây rối loạn cân bằng tự nhiên trong miệng và họng.
- Đau họng: nếu có các triệu chứng như: sốt, khạc đàm mủ, khó nuốt thức ăn hoặc không có cải thiện sau 5 ngày dùng thuốc hay có chiều hướng xấu hơn, nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Do thuốc có chứa sorbitol, nên có thể gây tiêu chảy hoặc đau bụng.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

- Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

- Chưa có dữ liệu thực nghiệm về sử dụng quá liều, tuy nhiên có thể xảy ra trạng thái phấn khích, buồn nôn, nôn, đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy.
- Cần tiến hành các biện pháp điều trị triệu chứng như rửa dạ dày, duy trì hô hấp và tuần hoàn nếu cần.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI:

- Hộp 1 tuýp x 24 viên nén ngậm.
- Ép vi Al/PVC: Hộp 2 vi x 10 viên, hộp 5 vi x 10 viên, Hộp 10 vi x 10 viên.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**



BOSTON

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM**

Số 43, đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐT: (0274) 3 769 606 - Fax: (0274) 3 769 601