



Hướng dẫn sử dụng

DUNG DỊCH XỊT TRỊ

Mogarna spray

Giới thiệu:

Mogarna spray dùng để xịt vào trong hậu môn để làm giảm các triệu chứng của bệnh trĩ, tình trạng sưng tấy do kích ứng và các rối loạn hậu môn trực tràng. Thành phần của **Mogarna spray** có chứa **Lidocain** để giảm đau tại chỗ trong thời gian ngắn, giúp giảm nhanh cảm giác đau, khó chịu. **Phenylephrin hydrochlorid** làm co các mạch máu nên có tác dụng làm giảm các triệu chứng sưng, bồng rập, sần se, cầm máu ở vùng hậu môn. **Mono-Ammonium Glycyrrhizinat** (chiết xuất tự nhiên từ cây cam thảo), **dịch chiết lô hội** có tác dụng chống viêm, giảm đau làm giảm triệu chứng tức thì tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Ngoài ra trong **Mogarna spray** có chứa **Natri hyaluronat** là 1 thành phần bảo vệ các mô, các mạch nhạy cảm của biểu mô niêm mạc hậu môn bằng cách bám dính và che giấu những chấn thương kể cả chấn thương của các mô bị viêm. Bên cạnh đó **Mogarna spray** còn chứa Allantoin và Alpha tocopherol (Vitamin E) là các thành phần giúp làm lành các vết trầy xước do cọ xát búi trĩ gây ra, cải thiện tuần hoàn máu, giảm chứng xuất huyết chảy máu khi đi vệ sinh.

Mogarna spray không gây nhờn dính, bần quăn áo và cảm giác khó chịu khi sử dụng.

Thành phần:

Lidocain (dưới dạng Lidocain HCl), Phenylephrin HCl, Mono-Ammonium Glycyrrhizinat, dịch chiết lô hội (Aloe Barbadosensis Leaf Juice), Allantoin, Natri Hyaluronat, Tocopheryl Acetat (Vitamin E), Butylated hydroxytoluen, Menthol, Glycerin, Polysorbat 80, Acrysol K140 (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), Natri methyl p-hydroxybenzoat, Natri propyl p-hydroxybenzoat, nước tinh khiết vừa đủ.

Quy cách đóng gói:

30 ml/chai. Hộp 1 chai.

Công dụng:

- Giảm các triệu chứng đau rát, ngứa, chảy máu khó chịu do trĩ
- Làm liền các vết thương, vết nứt kẽ hậu môn
- Ngăn ngừa hình thành các búi trĩ, nứt kẽ hậu môn
- Mất đi cảm giác đau rát, ngứa ngáy, chảy máu, khó chịu và làm co búi trĩ
- Sát trùng và làm dịu vùng hậu môn, giảm đau rát và ngứa khi đi đại tiện
- Giảm tạm thời tình trạng sưng tấy do kích ứng và các rối loạn hậu môn trực tràng khác
- Hỗ trợ trong việc bảo vệ các vùng hậu môn trực tràng bị kích thích

Cách dùng:

- Vệ sinh sạch và thấm khô vùng hậu môn trước khi sử dụng sản phẩm
- Xịt trực tiếp vào vùng tổn thương trong vòng 3 - 5 giây
- Sau khi xịt, nên đợi từ 1 - 2 phút ở tư thế ngồi để dịch không bị chảy và không đến được bộ phận sinh dục
- Dùng từ 2 - 4 lần/ngày. Tốt nhất là buổi sáng và buổi tối hoặc sau mỗi lần đi đại tiện
- **Lưu ý:** **Mogarna spray** phải được xịt gần nhất với vùng bị tổn thương ở hậu môn

Thận trọng

- Sản phẩm chỉ dùng đường hậu môn, tránh tiếp xúc với mắt, để xa tầm tay trẻ nhỏ

Lưu ý: Không sử dụng với những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất



CPC1HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

