

# MẪU NHÃN DỰ KIẾN (SCBS LẦN 2)

I. NHÃN HỘP: *MAS*

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 17/12/2015




ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.  
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
Sản xuất theo TCCS.  
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.



II. NHÃN GÓI:

*NAS*

**MEKOTRICIN**  
*Tyrosin 1mg*  
**GÓI 24 VIÊN NGÂM**



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR  
297/5 Lý Thường Kiệt-P.15-Q.11-TP. HCM-Việt Nam

---

**MEKOTRICIN**

**CÔNG THỨC:** Tyrosin 1mg; Tã được vữa đủ 1 viên.  
**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị tại chỗ chỗ nhiễm khuẩn niêm mạc vùng miệng, họng như viêm họng, amidan cấp tính, viêm miệng, viêm lợi.  
**CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Số lô XS:  
DH



**TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:** (SCBS LI)

## MEKOTRICIN

Viên ngậm

### CÔNG THỨC:

- Tyrothricin .....1 mg
  - Tá dược vừa đủ..... 1 viên
- (Menthol, Đường trắng, Povidone, Magnesium stearate)

N7A2

### DƯỢC LỰC HỌC:

- Tyrothricin là kháng sinh thuộc nhóm polypeptide, có tác dụng hiệu quả trên cầu khuẩn, trực khuẩn gram (+) và một số cầu khuẩn gram (-).

### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Tyrothricin được dùng chủ yếu trong điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn trên da và miệng.

### CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn niêm mạc vùng miệng, họng như viêm họng, amidan cấp tính, viêm miệng, viêm lợi.

### CÁCH DÙNG:

- Ngậm viên thuốc cho tan từ từ trong miệng. Không nên nhai hay nuốt.
- Liều dùng: ngậm 4-10 viên/ngày, cách khoảng 1 giờ giữa các lần ngậm.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 3 tuổi.

### THẬN TRỌNG:

- Bệnh nhân bị tiểu đường vì viên ngậm có chứa đường trắng.
- Điều trị không nên kéo dài quá 10 ngày.

### THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: độ an toàn của viên ngậm chứa Tyrothricin chưa được xác định ở phụ nữ mang thai. Thận trọng khi dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai.
- Thời kỳ cho con bú: không cho con bú khi dùng thuốc này.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Chưa thấy Tyrothricin gây ra tác dụng phụ ở liều điều trị.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa thấy có tương tác giữa Tyrothricin với các thuốc khác.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

### QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

### HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

### BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.



**TRÌNH BÀY:**

- Hộp 1 túi x 24 viên ngậm.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
297/5 Lý Thường Kiệt – Q11 – TP. Hồ Chí Minh

Ngày 09 tháng 03 năm 2015

**Tổng Giám Đốc**



*DS. Huỳnh Chi Lan*



**TU QU CỤC TRƯỞNG**  
**P. TRƯỞNG PHÒNG**  
*Nguyễn Thị Thu Thủy*

