

# MẪU NHÃN DỰ KIẾN

## I. NHÃN HỘP:

**GMP-WHO**

**HỘP 50 VỈ x 10 VIÊN NGẬM**

**CÔNG THỨC:**  
Menthol.....3mg  
Eucalyptol.....0,5mg  
Tá dược vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khản tiếng.

**CÁCH DÙNG:**  
- Người lớn: 10 - 15 viên/ngày.  
- Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**  
**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM - SX theo TCCS.**  
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 6/2/17

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
M.S.D.N: 0302533156 - C.T.C.P  
QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH

**MKP MEKOPHAR**  
**CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
297/5 Lý Thường Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam


SDK: Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD :

Handwritten signature or initials.



## II. NHÃN VỈ:

(Số lô SX, hạn dùng in phun trên vỉ)



NAS



**TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:**

**PASTITUSSIN**

Viên ngậm

**CÔNG THỨC:** Cho 1 viên

- Menthol.....3 mg
- Eucalyptol.....0,5 mg
- Tá dược vừa đủ..... 1 viên.

(Đường trắng, Carboxymethylcellulose sodium, Talc, Povidone, Magnesium stearate)

**TÍNH CHẤT:**

PASTITUSSIN là sự kết hợp của 2 chất:

- Menthol: có tác dụng sát khuẩn, làm giảm ho, giảm đau tại chỗ.
- Eucalyptol: có tác dụng sát khuẩn.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khàn tiếng.

**CÁCH DÙNG:**

Ngậm viên thuốc cho tan từ từ trong miệng, không nên nhai hay nuốt.

- Người lớn: 10 - 15 viên/ngày.
- Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng.
- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**THẬN TRỌNG:**

- Thận trọng với bệnh nhân tiểu đường vì mỗi viên ngậm có chứa 0,75 g đường.

**THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:**

Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

**TÁC DỤNG PHỤ:**

- Liều sử dụng chưa có tác dụng phụ.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Chưa thấy có tương tác giữa PASTITUSSIN với các thuốc khác.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

**QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:**

- Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**TRÌNH BÀY:** Hộp 50 vi x 10 viên.

Sản xuất theo TCCS

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc



ĐS. Huỳnh Thị Lan

TUO.CUC TRUONG  
P. TRUONG PHONG  
Đỗ Minh Hùng