

186 / 18148

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
 Lần đầu: 02 / 11 / 2014



**MAU HỘP VIÊN NÉN VITAMIN B2 2,0 mg**  
 Loại 100 viên

*Nz*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO  
 75 Yên Ninh - Bồ Đề - H. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội  
 Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
 Tư vấn khách hàng: 18006612  
 Trụ sở tại Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Mai - TP. Hà Nội

**Vitamin B2**  
 2,0 mg

100 VIÊN NÉN

**Vitamin B2**  
 2,0 mg

WHO-GMP

**Traphaco™**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

**THÀNH PHẦN:** Cho 1 viên  
 Vitamin B<sub>2</sub>..... 0,002g  
 Tá dược (Tinh bột, lactose, magnesi stearat, talc).....vừa đủ

**CHỈ ĐỊNH:** Phòng và điều trị khi thiếu vitamin B2. Sự thiếu hụt vitamin B2 có thể dẫn đến sự xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm nứt góc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vữa mạch trên giác mạc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
 Xin xem toa hướng dẫn sử dụng.

100 TABLETS

**Vitamin B2**  
 2.0 mg

WHO-GMP

**Traphaco™**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
 - Liều dự phòng: 2 mg/ngày.  
 - Liều điều trị:  
 - Trẻ em: 2 - 10 mg/ngày, chia thành những liều nhỏ.  
 - Người lớn: 6 - 30 mg/ngày, chia thành những liều nhỏ.

**BẢO QUẢN:**  
 Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**SĐK:**  
**LÔ SX:**  
**NSX:**  
**HD:**

Nhãn hộp: KT: 42 mm x 42 mm x 54 mm

ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

100 VIÊN NÉN

**Vitamin B2**  
 2,0 mg

WHO-GMP

**Traphaco™**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

**CHỈ ĐỊNH:** Phòng và điều trị khi thiếu vitamin B2. Sự thiếu hụt vitamin B2 có thể dẫn đến sự xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm nứt góc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vữa mạch trên giác mạc.

**SĐK:**  
**LÔ SX:**  
**NSX:**  
**HD:**

Nhãn lọ : KT: 20 x 80 (mm)

# MẪU HỘP VIÊN NÉN VITAMIN B2 2,0 mg

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén



Kích thước vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

**THÀNH PHẦN:** Chứa 1 viên:  
Vitamin B<sub>2</sub>.....2,0 mg  
Tà dược (tinh bột, Lactose, Magnesium stearat, Talc).....vđ

**CHỈ ĐỊNH:**  
Phòng và điều trị thiếu vitamin B<sub>2</sub>.  
B<sub>2</sub> có thể cần đến sự xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm niêm mạc miệng, viêm kết mạc mắt, viêm loét giác mạc, thoái hóa macula trên giác mạc.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
Liều dùng thông thường:  
- Trẻ em 2 - 10mg/ngày, chia thành 4-6 lần mỗi bữa ăn.  
- Người lớn: 6 - 10mg/ngày, chia thành 3-4 lần mỗi bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
Qua mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**  
Không thấy có tác dụng không mong muốn khi sử dụng Vitamin B<sub>2</sub>. Dùng liều cao Vitamin B<sub>2</sub> thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch độ và một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm.  
Không báo cáo tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

**THẬN TRỌNG - KHÔNG CẦN:**  
TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LẠI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

**Traphaco**

Thuốc dùng cho bệnh viện  
**(WHO-GMP)**

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

**Traphaco**

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

**Traphaco**

Thuốc dùng cho bệnh viện  
**(WHO-GMP)**

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

**Traphaco**

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén

Kích thước hộp: 183 mm x 87 mm x 108 mm

**VITAMIN B2**  
2,0 mg

SBK:  
Số lô SX:  
HDK:  
HD:

ĐƯỢC XỬ HƯỚNG DẪN ĐU ĐƯỢC TRƯỚC-KH DÙNG

ĐỂ XA TÂM TAY TIỆM

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
19 Nguyễn Văn Bội, Hà Nội, Việt Nam  
Số nhà 100, Ngõ 100, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số nhà 100, Ngõ 100, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hộp 60 vỉ x 30 viên nén

Toa hướng dẫn sử dụng

**VITAMIN B<sub>2</sub> 2,0 mg**



**TRÌNH BÀY:** Hộp 60 vi x 30 viên nén, hộp 1 lọ 100 viên nén

**CÔNG THỨC:** cho 1 viên

Vitamin B<sub>2</sub>.....2,0 mg

Tá dược (Lactose, Tinh bột, Talc , Magnesi stearat)....vừa đủ .....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**

Phòng và điều trị khi thiếu vitamin B<sub>2</sub>. Sự thiếu hụt vitamin B<sub>2</sub> có thể dẫn đến sự xuất hiện của hội chứng Ariboflavinosis bao gồm các triệu chứng như nứt môi, viêm nứt góc miệng, viêm loét lưỡi, viêm loét giác mạc, xơ vữa mạch trên giác mạc.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

- Liều dự phòng: 2mg/ngày.
- Liều điều trị:
  - Trẻ em: 2 – 10 mg/ngày, chia thành những liều nhỏ.
  - Người lớn: 6 – 30 mg/ngày, chia thành những liều nhỏ.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Không thấy có tác dụng không mong muốn khi sử dụng Vitamin B<sub>2</sub>. Dùng liều cao Vitamin B<sub>2</sub> thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

**THẬN TRỌNG:** Không có

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không ảnh hưởng.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Đã gặp một số ca “thiếu Vitamin B<sub>2</sub>” ở người đã dùng Clopromazin, Imipramin, Amitriptylin và Adriamycin. Rượu có thể gây cản trở hấp thu Vitamin B<sub>2</sub> ở ruột.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Không gây ảnh hưởng gì khi người mẹ dùng theo nhu cầu hàng ngày hoặc bổ sung liều thấp các Vitamin.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:**

Dùng quá liều vitamin B<sub>2</sub> thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt, gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòng thí nghiệm

Vitamin B<sub>2</sub> là một vitamin tan trong nước, đào thải qua thận. Khi lượng đưa vào vượt quá sự cần thiết của cơ thể sẽ thải dưới dạng không đổi trong nước tiểu

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội