

Povidine 10%

Dung dịch phụ khoa



CÔNG THỨC

- Povidon iod 9 g
- Tá dược: Nonoxynol 9, glycerin, dinatri hydrophosphat, acid citric, nước tinh khiết..... vừa đủ 90 ml.

CHỈ ĐỊNH

- Sát trùng phụ khoa: Viêm âm đạo, âm hộ.
- Chuẩn bị sanh: Sát trùng tầng sinh môn.
- Phụ trị: Huyết trắng, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Bôi bên trong và bên ngoài âm đạo với dung dịch nguyên chất.
- Pha loãng 2 muỗng canh trong 1 lít nước ấm, bơm thụt 1 hay 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với iod.
- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận; đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có iếm và protein. Xà phòng không làm mất tác dụng.
- Dùng cùng với các hợp chất thủy ngân gây ăn da.
- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao, và các thuốc sát khuẩn khác.
- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Tránh dùng thường xuyên ở phụ nữ mang thai và cho con bú. Mặc dầu chưa có bằng chứng về nguy hại, nhưng vẫn nên thận trọng và cân nhắc giữa lợi ích điều trị và tác dụng có thể gây ra do hấp thu iod đối với sự phát triển và chức năng của tuyến giáp thai nhi.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH

MÁY MÓC: Chưa thấy báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Dùng chế phẩm lâu ngày có thể gây kích ứng tại chỗ hoặc hiếm hơn gây phản ứng dị ứng da.
- Dùng lặp lại với vết thương rộng hoặc vết bỏng nặng,

- có thể gây phản ứng toàn thân.

* **Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

- Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùng chế phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn như vị kim loại, tăng tuyến nước bọt, đau rát họng và miệng, mắt bị kích ứng, sưng, đau dạ dày, ỉa chảy, khó thở do phù phổi...có thể có nhiễm acid chuyển hoá, tăng natri huyết và tổn thương thận.
- Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon-iod, phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặt biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

DƯỢC LỰC HỌC

- Povidon iod là một phức hợp hữu cơ có chứa 10% iod hoạt tính. Thuốc được dùng là chất sát khuẩn, tẩy rửa.
- Povidine tác dụng diệt vi khuẩn gram dương và gram âm, đặc biệt với các loại gây nhiễm trùng da như *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E.coli*, *Proteus*, *P. aeruginosa*. Thuốc cũng diệt được vi nấm, siêu vi, đơn bào và nấm men.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Povidon iod phóng thích dần dần và liên tục iod tự do, chất này thấm qua da và được đào thải qua nước tiểu.

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY: Hộp 1 chai 90 ml.

BẢO QUẢN

- Ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Đậy nắp kín ngay sau khi dùng.
- Chỉ sử dụng trong 2 tháng sau khi mở nắp.

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Q.12, TP.HCM, Việt Nam.