

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 26/5/2015

*uh*



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg

Tà dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4

SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg

Tã dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mảy đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Đề xa tã tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**





**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**


Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là 1/2 viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khanh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

*Handwritten signature or initials.*





**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 \* Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

*Handwritten signature*

Hộp 20 vỉ x 15 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, may đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là 1/2 viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.629.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khanh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**





**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khanh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg

Ta được v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

*Handwritten signature*







**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

*Handwritten signature*



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tà dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



*Handwritten signature*



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**





**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg

Tà dược v.d ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

*Handwritten signature*



**THÀNH PHẦN**

Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, ngứa da mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**


Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



*Handwritten signature*



Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • FAX: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 15 viên



Nhãn vỉ 20 viên



Nhãn chai 100 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**Cetazim**  
Cetirizin dihydroclorid 10mg

100 viên  
nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**  



**Cetazin<sup>®</sup>**  
Cetirizin dihydroclorid 10mg

200 viên  
nén bao phim

MST: 110012319  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
www.vacopharm.com

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

Nhãn chai 250 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**  



**Cetazin<sup>®</sup>**  
Cetirizin dihydroclorid 10mg

250 viên  
nén bao phim

MST: 110012319  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
www.vacopharm.com

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**  



**Cetazin<sup>®</sup>**  
Cetirizin dihydroclorid 10mg

500 viên  
nén bao phim

MST: 110012319  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
www.vacopharm.com

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Cetirizin dihydroclorid ..... 10mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.  
Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.  
Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**  



**Cetazin<sup>®</sup>**  
Cetirizin dihydroclorid 10mg

1000 viên  
nén bao phim

MST: 110012319  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
www.vacopharm.com

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,  
Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com



## CETAZIN

### Thành phần

Cetirizin dihydroclorid

10mg

Tá dược v.d

1 viên nén bao phim

(Tinh bột sắn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Lactose phun sấy, Talc, Natri starch glycolat, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, PEG 6000)

**Quy cách đóng gói:** kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 50 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 100 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
10	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ
11	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ
12	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
13	Đóng chai 100 viên
14	Đóng chai 200 viên
15	Đóng chai 250 viên
16	Đóng chai 500 viên
17	Đóng chai 1000 viên

### Dược lực học

Cetirizin.2HCl là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ ở liều dược lý.

Cetirizin.2HCl có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể  $H_1$ , nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng serotonin.

Cetirizin.2HCl ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

### Dược động học

Nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống liều 10mg.

Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể.

Độ thanh thải ở thận là 30ml/phút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên kết mạnh với protein huyết tương (khoảng 93%).

### Chỉ định

Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em và viêm kết mạc dị ứng.

### Liều dùng và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/ngày.

Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là ½ viên/lần/ngày.

### Chống chỉ định

Người bệnh mẫn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.

Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

### Thận trọng

Điều chỉnh liều ở người suy thận và người đang thẩm phân thận nhân tạo, người suy gan.

Người lái xe và vận hành máy móc.

Tránh dùng đồng thời với rượu và các chất ức chế thần kinh trung ương vì làm tăng tác dụng của các thuốc này.



**Phụ nữ có thai và cho con bú:** tuy Cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng khi có thai. Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.

**Người lái xe và vận hành máy móc:** thận trọng khi sử dụng hoặc tham khảo ý kiến của Thầy thuốc.

**Tác dụng không mong muốn:** hay gặp là ngủ gà (tỉ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng), mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Ít gặp: chán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đờ bụng, tăng tiết nước bọt. Hiếm gặp: thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, úm mắt, viêm cầu thận.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**Tương tác thuốc:** chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng với 400mg Theophylin.

#### **Quá liều và xử trí**

**Triệu chứng:** ngủ gà ở người lớn, trẻ em có thể bị kích động.

**Xử trí:** Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu

#### **Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng**

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4.

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**Công ty cổ phần Dược VACOPHARM**

**59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

**Điện thoại: (072) 3821627-3829311**

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

*Handwritten signature*



**TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
Đỗ Minh Hùng**