

**(Rx)** Thuốc bán theo đơn

**Gliclada 30mg**

Mỗi viên nén phóng thích kéo dài chứa: Gliclazide 30mg  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**  
**Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng: xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.**  
 \*Các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo\*.  
 Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.  
**SDK:** Số lô SX, NSX, HD xem "Batch", "Mfg", "Exp" trên bao bì

Sản xuất bởi  
**KRKA, D.D., NOVO MESTO,**  
 Slovenia

Nhập khẩu bởi:

Đăng ký bởi:  
 S.L.A. (TENARVO CANADA) INC.

**BỘ Y TẾ  
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
 ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 8/6/2017

Each modified-release tablet contains 30 mg gliclazide.  
 Contains lactose monohydrate.  
 For Indication, Contraindication, Precaution and Recommended dosage see enclosed package insert.  
 Keep out of the reach and sight of children.  
 Read carefully the package leaflet insert before use.  
 Do not use after the expiry date stated on the packaging.  
 Store in a cool and dry place, protect from light, at temperature below 30°C  
 Store in the original package.

Manufactured by: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia



**Gliclada 30mg**  
 modified-release tablets

8 Blisters x 15 Modified-release Tablets

KRKA

**Gliclada 30mg**  
 modified-release tablets

8 Blisters x 15 Modified-release tablets

**(Rx) Prescription drug**

**Gliclada 30mg**  
 modified-release tablets

Gliclazide  
**8 Blisters x 15 Modified-release tablets**  
 Oral use

KRKA

4 3  
 Batch: Exp: Mfg. Date: Visa No:

**Gliclada 30mg**  
 Gliclazide 30mg

Manufactured by: KRKA  
 KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovenia  
 Registered by: S.L.A. (TENARVO CANADA) INC.

**Gliclada 30mg**  
 Gliclazide 30mg

Manufactured by: KRKA  
 KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovenia  
 Registered by: S.L.A. (TENARVO CANADA) INC.

**Gliclada 30mg**  
 Gliclazide 30mg

Manufactured by: KRKA  
 KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovenia  
 Registered by: S.L.A. (TENARVO CANADA) INC.

Batch No.: Exp. Date: Visa No.:

**SI.A. (TENARVO CANADA) INC**  
**VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T. PHẠ NỘI**







Rx - Thuốc bán theo đơn

GLICLADA 30MG Gliclazide 30mg

Công thức: Mỗi viên nang cứng kéo dài chứa... Công dụng: Hạ đường huyết... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Đặc tính dược học: Gliclazide là một sulfamide hạ đường huyết... Tác dụng phụ: Đau đầu, buồn nôn, chóng mặt... Chống chỉ định: Suy thận nặng...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Liều dùng và cách dùng: Thuốc dùng đường uống... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn... Lưu ý: Tránh rượu bia...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

ở những bệnh nhân này có thể là do sự tiến triển mức độ nghiêm trọng của bệnh tiểu đường... Lưu ý: Tránh rượu bia...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...

Chỉ định điều trị: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin... Chống chỉ định: Suy thận nặng... Dùng thuốc: Uống trước bữa ăn...



Sản xuất bởi: KRKA, D.D., NOVO MESTO. Đăng ký bởi: S.I.A (TENAMYD CANADA) INC.