

Rx

V.phonte

Thuốc Này Chi Dùng Theo Đơn Thuốc
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
Nếu Cần Thêm Thông Tin Xin Hỏi Ý Kiến Bác Sĩ

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa:

- Thành phần hoạt chất:

Cao khô hỗn hợp dược liệu	390 mg
(Tương ứng với: Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	330 mg
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	330 mg
Tang ký sinh (<i>Herba Loranthe Gracifilolii</i>)	330 mg
Tân giao (<i>Radix Gentianae</i>)	330 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	330 mg
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	330 mg
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	330 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	330 mg
Đồ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	330 mg
Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	60 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	60 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	60 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	60 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	30 mg)

- Thành phần tá dược: Lactose, bột talc, magnesi stearat, ethanol 96%, DST, pharmacoat 606, màu Ponceau 4R, màu Brown HT vừa đủ 01 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim

MÔ TẢ DẠNG BÀO CHẾ: Viên bao phim hình bầu dục, màu nâu đỏ, bên trong là nhân có màu nâu, mùi thơm dược liệu.

TÁC DỤNG:

- Bổ khí huyết, ích can thận, tán hàn, trừ phong thấp.
- Giảm đau, chống viêm: cơ, xương khớp, thần kinh.

CHỈ ĐỊNH: Giảm đau và chống viêm trong các bệnh:

- Đau khớp do: viêm khớp gối, viêm khớp háng, viêm khớp bàn chân, viêm cột sống.
- Đau dây thần kinh hông (tọa), đau dây thần kinh liên sườn.
- Đau xương, cơ do: teo cơ, loãng xương.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

Người lớn: 2-4 viên/lần, 2-3 lần/ngày.

Trẻ em: + Từ 2-5 tuổi: 0,5-1 viên/lần, 2-3 lần/ngày

+ Từ 6-12 tuổi: 1-2 viên/lần, 2-3 lần/ngày

+ Trên 12 tuổi: Dùng như người lớn

Uống sau khi ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với thành phần trong bài thuốc, phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG: Người âm hư, huyết hư, háo khát, tiêu đường. Với thể nhiệt: cảm giác nóng nực (có thể có sốt), khớp cơ xương đau nóng nên dùng kết hợp với thuốc bổ âm, dưỡng huyết.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai: Thuốc này không dùng cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ THUỐC:

Tương kỵ thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc nên không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU:

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Nóng nực, khó chịu.

Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều, dùng kết hợp đồ mát, dùng thêm 2-3 viên Superyin 1 lần, ngày 2-3 lần.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 40 viên bao phim, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản phẩm có bán online tại: www.vanxuanpharma.com.vn

Liên hệ Hotline: 0931.288.789. Giao hàng toàn quốc

CƠ SỞ SẢN XUẤT:  **CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN**

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - ĐT/Fax: (028) 37624848- Website: vanxuanpharma.com.vn