

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

(Bổ sung lần 1)

Tên thuốc : **HAGIZIN**

Dạng thuốc : **VIÊN NANG**

Hàm lượng cho 1 viên:

Flunarizin dihydroclorid 5,9 mg

(Tương đương 5 mg flunarizin)

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc :


HAGIZIN

Dạng thuốc :

VIÊN NANG

Hàm lượng cho 1 viên:

Flunarizin dihydroclorid 5,9 mg
(Tương đương 5 mg flunarizin)



Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên vỉ 10 viên nang:



* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên (bổ sung lần 1):

HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NANG
Flunarizin 5 mg
Hagizin
Rx

M.S.D.N: 1800106801-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
Q. MINH KIỂU TP. CẦN THƠ

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN GMP-WHO

Hagizin
Flunarizin 5 mg

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000
www.dhgpharma.com.vn

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Minh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209

Rx FOR PRESCRIPTION ONLY GMP-WHO

Hagizin
Flunarizine 5 mg

INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS -
DOSAGE & ADMINISTRATION:
Please see the enclosed leaflet.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
STORAGE CONDITIONS:
STORE IN DRY PLACES, NOT EXCEEDING 30°C.
SPECIFICATIONS: MANUFACTURER'S.

SBK (Reg. No.):

8 935206 1005875

HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NANG DHG PHARMA

BOX OF 10 BLISTERS X 10 CAPSULES DHG PHARMA

Ngày SX (Mfg. date):
Số M SX (Batch No.):
HĐ (Exp. date):

Handwritten signature

* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc** (bổ sung lần 1):



Rx **Hagizin**
Flunarizin 5 mg

CÔNG THỨC:

Flunarizin 5 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
(Lactose, PVP K30, talc, magnesi stearat, sodium starch glycolat).

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

DƯỢC LỰC HỌC: Flunarizin có tác dụng kháng histamin, an thần và ức chế kênh calci được sử dụng để phòng ngừa bệnh đau nửa đầu, chóng mặt và rối loạn tiền đình. Flunarizin cũng được sử dụng trong rối loạn tuần hoàn não và tuần hoàn ngoại vi.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Hagizin hấp thu tốt qua đường ruột, gắn kết khoảng 90% với protein huyết tương, đạt nồng độ đỉnh trong vòng 2 - 4 giờ và đạt trạng thái hằng định ở tuần thứ 5 - 6. Hagizin được chuyển ở hóa gan và được bài tiết ra phân qua đường mật. Thời gian bán hủy thải trừ tạn cùng khoảng 18 ngày.

CHỈ ĐỊNH: Dự phòng đau nửa đầu. Điều trị triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, ù tai,... do rối loạn tiền đình. Rối loạn kích thích, mất trí nhớ, kém tập trung và rối loạn giấc ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân có tiền sử trầm cảm, có triệu chứng Parkinson hay rối loạn ngoại tháp.

THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai và cho con bú. Người lái xe và vận hành máy móc. Suy giảm chức năng gan. Nếu xuất hiện các triệu chứng như: trầm cảm, rối loạn ngoại tháp, mệt mỏi gia tăng thì nên ngưng điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Khi dùng đồng thời Hagizin với thuốc ngủ, thuốc an thần, rượu, hay thức uống chứa cồn đều có thể gia tăng quá mức tác dụng của Hagizin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Buồn ngủ, tăng cân, buồn nôn, ợ nóng, khô miệng, lo lắng. Hiếm khi xảy ra tình trạng phát ban, đau cơ, triệu chứng ngoại tháp (như vận động chậm, cứng đơ, ngồi nằm không yên, loạn vận động, run).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng: buồn ngủ và suy nhược có thể xảy ra. Một vài trường hợp quá liều cấp (1 lần uống 600 mg) đã được báo cáo với triệu chứng là buồn ngủ, tim đập nhanh, kích động.

Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu. Trong vòng 1 giờ sau khi uống quá liều, nên súc rửa dạ dày. Có thể dùng than hoạt nếu thấy thích hợp.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào buổi tối.

Người lớn trên 65 tuổi: Uống 1 viên x 1 lần/ ngày.

Người lớn dưới 65 tuổi và trẻ em có thể trọng từ 20 - 40 kg: uống 2 viên x 1 lần/ ngày.

Trẻ em thể trọng dưới 20 kg: Mỗi lần uống 1 viên, khoảng cách giữa 2 lần uống là 2 ngày.

Trong trường hợp dự phòng đau nửa đầu: Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc và cần điều trị duy trì thì nên giảm liều xuống: uống 5 ngày liên tiếp với liều như trên và nghỉ uống 2 ngày một tuần. Thời gian điều trị không quá 6 tháng và chỉ bắt đầu lại nếu tái phát.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn

stnh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Diệp

ph