




**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
 Lần đầu: 19/9/2017


**ACTISO PV**



**ACTISO PV**  
 Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật,  
 tiêu hóa kém.

Hộp 1 lọ x 100 viên nang mềm



**ACTISO PV**

**THÀNH PHẦN**

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
 (Extractum Cynarae spissum)  
 Tương đương dược liệu Actiso.....5000 mg  
 (Folium Cynarae Scolymii)  
 Tá dược: Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cò, lecithin, nipectin, nipectol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

**CHỈ ĐỊNH**


Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật tiêu hóa kém

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**



- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.




**ACTISO PV**



**ACTISO PV**  
 Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật,  
 tiêu hóa kém.

Hộp 1 lọ x 100 viên nang mềm



**ACTISO PV**

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG**

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

**BẢO QUẢN**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

- TƯƠNG TÁC THUỐC: CHUA CÓ BẢO CÁO
- TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: CHUA CÓ BẢO CÁO

Thông báo nguy cơ tác dụng phụ của thuốc không mong muốn của thuốc:  
 Độc lý tương đối sử dụng trước khi dùng  
 Mẫn cảm thêm nặng ăn uống kém hấp thu  
 Dễ trước tránh xa tầm tay trẻ em  
 Không sử dụng thuốc quá hạn

Thêu chuẩn: TCSS  
 S&K:  
 S&S SX  
 NSX  
 HD



Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**  
 Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất -  
 Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,  
 thành phố Hà Nội.  
 Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

[duocphucvinh.com](http://duocphucvinh.com)



**THÀNH PHẦN**

Gao khô Actiso.....300,0 mg  
(Extractum Cynarae spissum)  
Tương đương được liệu Actiso.....5000 mg  
(Folium Cynarae Scolymii)  
Tà được vừa đủ 1 viên.

**CHỈ ĐỊNH**


Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.

Tiêu chuẩn: TCCS / SDK:

144 X 44



Là 100 viên nang mềm

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG**

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

**BẢO QUẢN**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn:


Xem chi tiết tên tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH**

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

Số lô SX:  
NSX:  
HD:






# ACTISO PV



## ACTISO PV

*Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.*



Hộp 1 tạ x 60 viên nang mềm



## ACTISO PV

### THÀNH PHẦN

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
 (Extractum Gynurae spissum)  
 Tương đương được hiệu Actiso.....5000 mg  
 (Folium Gynurae Scalyml)  
 Tã được: Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cò, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanillin, brown HT, Black iron oxide, Ehandol 99<sup>®</sup>, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

### CHỈ ĐỊNH

Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém


### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Người viêm tắc mật, người hư thận, tiêu chảy.



## ACTISO PV

*Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.*



Hộp 1 tạ x 60 viên nang mềm



## ACTISO PV

### CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

### Bảo quản

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

- TRONG TÁC THUỐC: CHỮA TỬ BẢO CAO
- TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: CHỮA CỎ BẢO CAO

Thông báo nguy cơ tác hại sẽ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.  
 Đặc ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 Nếu cần thêm thông tin xin liên hệ dược sĩ, dược sỹ  
 Rễ trước trình xin liên hệ kỹ sư  
 Không sử dụng thuốc quá hạn

### Tên chuẩn: TCSS

SBK:

Số 16 SX

NSX

HD

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**  
 Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất -  
 Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,  
 thành phố Hà Nội.  
 Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

duocphucvinh.com



### THÀNH PHẦN

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
(Extractum Cynarae spissum)  
Tương đương được liệu Actiso.....5000 mg  
(Folium Cynarae Scolymii)  
Tã được vừa đủ 1 viên.

### CHỈ ĐỊNH

Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.

Tiêu chuẩn: TCCS / SDK:

144 X 44



Lọ 60 viên nang mềm

### CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

### BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn:*

*Xem chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp*

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH**

Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948



Số lô SX:

NSX:

HD:




# ACTISO PV



## ACTISO PV

*Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.*



Hộp 1 box 50 viên nang mềm



## ACTISO PV

### THÀNH PHẦN

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
(Extractum Ononae spissum)  
Tương đương dược liệu Actiso.....5000 mg  
(Folium Ononae Scoldym)  
Tá dược: Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cá, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, galatin, glycerin, sorbitol, vanillin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

### CHỈ ĐỊNH

Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém


### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Người viêm tắc mật, người hư thận, tiêu chảy.



## ACTISO PV

*Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.*



Hộp 1 box 50 viên nang mềm



## ACTISO PV

### CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

### BAO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

- TƯƠNG TÁC THUỐC: CHUA CÓ BẢO CHỘ
- TÁC DỤNG KHÔNG MƯƠNG MƯƠNG: CHUA CÓ BẢO CHỘ

Thầy thuốc người cho kê đơn sẽ kê đơn phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.  
Đặc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin liên hệ Viên Dược Sĩ được sự  
Đã được trình ra đơn tại cơ sở  
Không sử dụng thuốc quá hạn

### Tên chuẩn: TCOS

SBK  
S6 M SX  
MSX  
HD

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**

Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất -  
Quốc Oai, xã Phú Hưng Xã, huyện Thạch Thất,  
thành phố Hà Nội.  
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

duocphucvinh.com



### THÀNH PHẦN

Gao khô Actiso.....300,0 mg  
(Extractum Cynarae spissum)  
Tương đương được liệu Actiso.....5000 mg  
(Folium Cynarae Scolymii)  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

### CHỈ ĐỊNH

Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH


- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.

Tiêu chuẩn: TCCS / SDK:

144 X



 **ACTISO PV**



### CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

### BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn:

Xem chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH**

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

Số lô SX:

NSX:

HD:





# Vỉ nhôm\_Actiso

135mm



Kích thước 61 x 106mm x 2 vỉ  
Khoảng cách 2 vỉ: 5mm



In 1 màu tím pha

→  
Hướng nhôm chạy

Ghi chú: Số lô SX, hạn dùng được dập nổi bằng nhiệt của máy ép vỉ trên màng PVC (mặt trước của vỉ thuốc)



**THÀNH PHẦN**

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
(*Extractum Cynarae spissum*)  
Tương đương dược liệu Actiso.....5000 mg  
(*Folium Cynarae Scolymii*)  
Tá dược: Aetosil, Sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên

**CHỈ ĐỊNH**

• Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG**

• Uống 1 viên/tần x 2 lần/ngày

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

• Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc  
• Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**  
Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.  
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

## ACTISO PV

• TƯƠNG TÁC THUỐC: CHƯA CÓ BÁO CÁO  
• TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: CHƯA CÓ BÁO CÁO

Thông báo ngay cho bác sĩ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

**BẢO QUẢN**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ  
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em  
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS  
SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

ACTISO PV

125x90x30 mm



**THÀNH PHẦN**

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
(*Extractum Cynarae spissum*)  
Tương đương dược liệu Actiso.....5000 mg  
(*Folium Cynarae Scolym*)  
Tá dược: Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên

**CHỈ ĐỊNH**

• Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG**

• Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

• Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc  
• Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm



Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**  
Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.  
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

## ACTISO PV

• TƯƠNG TÁC THUỐC: CHƯA CÓ BÁO CÁO  
• TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: CHƯA CÓ BÁO CÁO

Thông báo ngay cho bác sỹ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

**BẢO QUẢN**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ  
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em  
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS  
SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm



**ACTISO PV**

125x90x30 mm

**THÀNH PHẦN**

Cao khô Actiso.....300,0 mg  
(*Extractum Cynarae spissum*)  
Tương đương dược liệu Actiso.....5000 mg  
(*Folium Cynarae Scolym*)  
Tã được: Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nước tinh khiết vừa đủ 1 viên

**CHỈ ĐỊNH**

• Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG**

• Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

• Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc  
• Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH**  
Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,  
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.  
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

## ACTISO PV

• TƯƠNG TÁC THUỐC: CHƯA CÓ BÁO CÁO  
• TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: CHƯA CÓ BÁO CÁO

Thông báo nguy cho bác sỹ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

**BẢO QUẢN**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.  
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em  
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS  
SĐK:  
Số lô SX:  
HĐ:



# ACTISO PV

Chỉ định: Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

**ACTISO PV**

125x90x30 mm



Tờ hướng dẫn sử dụng

**ACTISO PV**

1. **Thành phần:** mỗi viên chứa

STT	Tên	Khối lượng(mg)
1	Cao khô Actiso ( <i>Extractum Cynarae spissum</i> )	300,0
<i>Tương đương dược liệu Actiso( Folium Cynarae Scolymi): 5000 mg</i>		
<i>Tá dược:</i>		
Aerosil, Sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96 <sup>0</sup> , nước tinh khiết vừa đủ 1 viên		Vừa đủ

- Dạng bào chế:** viên nang mềm
- Quy cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 1 lọ x 50 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên kèm một tờ hướng dẫn sử dụng
- Chỉ định điều trị:**
  - Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.
- Liều lượng và cách dùng:**
  - Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Tác dụng không mong muốn:**
  - Chưa có báo cáo

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*
- Tương tác thuốc:**
  - Chưa có báo cáo
- Chống chỉ định:**
  - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
  - Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.
- Bảo quản:**
  - Nơi khô, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup> C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất
- Tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.**  
**Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em**

**Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh**

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện  
Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04. 35592948

Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dào Đình Bảng*

### TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

- Tên sản phẩm:** ACTISO PV
- Mô tả sản phẩm:**
  - Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 1 lọ x 50 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên kèm một tờ hướng dẫn sử dụng.
- Thành phần, hàm lượng của thuốc:**

Thành phần (INN)	Khối lượng (mg)
<i>Dược chất</i>	
Cao khô Actiso ( <i>Extractum Cynarae spissum</i> )	300,0
<i>Tương đương dược liệu Actiso( Folium Cynarae Scolymi): 5000 mg</i>	
<i>Tá dược vừa đủ 1 viên</i>	

- Chỉ định điều trị**
  - Viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém.
- Cách dùng và liều lượng**
  - Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Khi nào không nên dùng thuốc này?**
  - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
  - Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy.
- Tác dụng không mong muốn**
  - Chưa có báo cáo
  - Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*
- Tương tác với những thuốc khác**
  - Chưa có báo cáo
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**
  - Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
- Bảo quản thuốc**
  - Nơi khô, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup> C, tránh ánh sáng.
- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều**
  - Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
- Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo**
  - Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.
- Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:**  
Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.



Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04. 35592948

**14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này**

- Không có thận trọng đặc biệt.

**15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ**

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn ý kiến bác sỹ.

Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dào Đình Bảng*



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG

*Đỗ Minh Hùng*

