


CAPTOHASAN comp 25/12.5

Hộp 03 vỉ x 10 viên nén

Kích thước: 46 x 18 x 97 mm

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 19/09/17



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trần Đình Hương


CAPTOHASAN comp 25/12.5

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Kích thước: 46 x 46 x 97 mm



CAPTOHASAN comp 25/12.5

Vỉ 10 viên nén
Kích thước: 40 x 92 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trần Đình Hương

Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân

CAPTOHASAN comp 25/12.5

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ để xa tâm tụy trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC

- Dược chất: Captopril 25 mg Hydrochlorozid 12.5 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể 101, tinh bột ngô, acid stearic.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt phẳng, một mặt có khắc vạch ngang, cạnh và thành viên lành lặn.

QUY CÁCH DÙNG

- Hộp 03 vỉ x 10 viên nén. Vỉ bấm A/PVC trong.
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Vỉ bấm A/PVC trong.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ

Captopril thuộc nhóm thuốc ức chế men chuyển, làm giãn rộng mạch máu, dẫn đến làm giảm huyết áp và giúp tim để dàng bơm máu đi khắp cơ thể. Hydrochlorozid là thuốc lợi tiểu, làm tăng thải nước và muối qua nước tiểu, dẫn đến làm giảm huyết áp.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu không chắc chắn về cách dùng thuốc. Số lượng thuốc tùy thuộc vào tình trạng bệnh của bạn.

Liều dùng

- Người lớn: Liều thông thường 50 mg captopril - 25 mg hydrochlorozid (2 viên) x 1 lần/ngày vào buổi sáng. Liều tối đa 2 viên.
Người bị đái tháo đường: Liều khởi đầu 25 mg captopril - 12.5 mg hydrochlorozid (1 viên) x 1 lần/ngày.
Người bị suy giảm chức năng thận: Bác sĩ sẽ giảm liều cho bạn. Không dùng Captopril comp 25/12.5 nếu bạn bị suy thận nghiêm trọng.
Người cao tuổi: Liều khởi đầu 25 mg captopril - 12.5 mg hydrochlorozid (1 viên) x 1 lần/ngày.

Trẻ em

Không khuyến dùng.

Cách dùng

Uống Captopril comp 25/12.5 trước, trong hoặc sau bữa ăn, cùng với 1 cốc nước. Có thể hệ đôi viên thuốc để uống.

KHUYẾN KHÍCH NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Không dùng Captopril comp 25/12.5 nếu bạn đang, hoặc đã từng bị dị ứng với captopril, hydrochlorozid, các thuốc ức chế ACE, nhóm sulfonamid hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Bi phụ mạch không rõ nguyên nhân hoặc do di truyền.
Bi suy giảm chức năng gan hoặc thận nghiêm trọng.
Có thai trên 3 tháng (tốt nhất nên tránh dùng Captopril comp 25/12.5 vào đầu thai kỳ).
Dùng đồng thời Captopril comp 25/12.5 và các thuốc chứa aliskiren ở người bệnh bị đái tháo đường hay suy thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như các thuốc khác, Captopril comp 25/12.5 có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn, mặc dù không phải bệnh nhân nào cũng gặp phải. Báo ngay cho bác sĩ và đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu nếu bạn nhận thấy một trong các dấu hiệu sau:

- Sưng mắt, tay chân, môi, lưỡi/ cổ họng.
Ngứa hoặc sưng nghiêm trọng.
Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi bạn gặp một trong những vấn đề sau:
Thường gặp (ảnh hưởng 1-10 trong 100 người):
Không đau, chóng mặt.
Bất thường về vị giác, buồn nôn, nôn, kích ứng da, đau bụng, tiêu chảy, táo bón.
Ngứa có hoặc không có phát ban, phát ban, rụng tóc.
Liệt (ảnh hưởng 1-10 trong 1000 người):
Nhịp tim nhanh, đau thắt ngực, đánh trống ngực, tức ngực, huyết áp thấp.
Tê hoặc ngứa ran ở ngón tay và ngón chân, sưng mắt và môi.
Đỏ bừng mặt, như nhợt nhạt, cảm thấy mệt mỏi.
Hiếm gặp (ảnh hưởng 1-10 trong 10000 người):
Buồn ngủ, đau đầu, cảm giác kim châm.
Không nguy, loét miệng, các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn,

CÁN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO
Bảo quản thuốc ở nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Không sử dụng thuốc sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp thuốc hay vỉ thuốc.
Không nên vứt bỏ thuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt. Hỏi ý kiến dược sĩ cách bỏ thuốc không sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHIDÙNG THUỐC QUÁ LIỀU
Các triệu chứng khi dùng thuốc quá liều thường gặp như: tiêu chảy, mất cân bằng chất điện giải, hạ huyết áp trầm trọng, mất ý thức (bao gồm hôn mê), co giật, nhịp tim chậm, loạn nhịp tim, suy thận.

CÁN PHẢI LÀM GÌ KHIDÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO
Thông báo ngay cho bác sĩ và đến bệnh viện gần nhất. Mang theo bao bì ngoài của thuốc để bác sĩ xác định bệnh đã dùng quá liều thuốc nào.

NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH TRONG KHIDÙNG THUỐC NÀY
Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng Captopril comp 25/12.5 nếu bạn có hoặc đã từng có các dấu hiệu về sau đây:
Mất nước do tiêu khát, tiêu chảy, tiêu chảy, tiêu chảy, tiêu chảy, tiêu chảy hoặc tiêu chảy. Sau khi dùng thuốc, có thể xảy ra hạ huyết áp mạnh khiến bạn cảm thấy đau đầu nhẹ hoặc ngất.

Các rối loạn về tim như suy tim, hẹp động mạch chủ hoặc van hai lá, phì đại cơ tim, hoặc tình trạng liên quan đến mạch máu nhỏ.
Các vấn đề về thận.
Ho nặng càng nhiều.
Captopril cũng có thể gây một số tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn và nôn, đầy hơi.

Phẫu thuật có gây mê toàn thân.
Dùng chung với các chế phẩm bổ sung kali, lithi hoặc thuốc trị đái tháo đường.
Bi nhiễm trùng với các triệu chứng như sốt kèm theo suy giảm thể chất nghiêm trọng, hoặc sốt có nhiễm trùng tại chỗ như đau họng, các vấn đề về đường tiêu.

Khi bạn xét nghiệm đối kháng doping, hydrochlorozid có thể làm kết quả dương tính.
Khi bạn xét nghiệm bentiromid tuyến giáp, hydrochlorozid có thể làm sai kết quả.

Thuốc có chứa lactose monohydrat. Thông báo với bác sĩ nếu bạn không dung nạp một số loại đường.
Phụ nữ mang thai: Thông báo với bác sĩ khi bạn đang mang thai hoặc có ý định mang thai. Bác sĩ sẽ khuyến bạn ngưng dùng Captopril comp 25/12.5 hoặc đổi sang thuốc khác. Không nên dùng Captopril comp 25/12.5 trong 3 tháng đầu thai kỳ và không dùng khi mang thai hơn 3 tháng do có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho thai nhi.

Phụ nữ cho con bú: Thông báo với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú hoặc bắt đầu cho con bú. Không khuyến cáo dùng Captopril comp 25/12.5 khi nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Ở trẻ lớn hơn, bác sĩ sẽ cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, so sánh với những điều trị khác để đưa ra lời khuyên cho bạn.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Captopril comp 25/12.5 có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc, nhất là giai đoạn bắt đầu điều trị, khi bác sĩ chính liều hoặc phải chờ đợi. Nếu bạn cảm thấy đau đầu hoặc chóng mặt, không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.

KHINÀO CÁN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ
Phụ nữ mang thai, có kế hoạch mang thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.
Bản có các bệnh lý về gan, thận.
Bản có các bệnh lý về tim mạch.

Nếu cần thêm thông tin nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
HẠN DÙNG
36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đông An, Bình Dương, Việt Nam



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Dỗ Minh Hùng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dỗ Trần Đình Hương