


Viên nén CETIRIZIN 10mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

25/11/22

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**
1/ Nhân viên:
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8 / 11 / 2013



2/ Nhân hộp:

Cetirizin 10mg

100 VIÊN NÉN

Cetirizin 10mg




CHỈ ĐỊNH:
- Cetirizin là một kháng histamine H1 không gây buồn ngủ. Có tác dụng viêm mũi dị ứng, những triệu chứng về mắt như : mắt đỏ, chảy nước mắt, ngứa nổi mề đay, chàm dị ứng, viêm da do tiếp xúc, phản ứng dị ứng cấp tính do thuốc, thức ăn, vết đốt sâu bọ.

LIỀU DÙNG:
- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi : 10mg một lần mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem toa bên trong.

Cetirizin 10mg

100 VIÊN NÉN

Cetirizin 10mg




THÀNH PHẦN:
Cetirizin 2HCl10mg
Tá dược Vd..... 1 viên

Tiêu chuẩn: TCCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322 - Lý Văn Lâm - P1 - TP. Cà Mau

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN NHỆT ĐỘ DƯỚI 30°C, NƠI KHÔ MÁT, TRÁNH ÁNH SÁNG.

Số lô sx:
Ngày sx:
Hạn dùng:



MẪU TOA HƯỚNG DẪN

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx: Thuốc bán theo đơn

CETIRIZIN

THÀNH PHẦN: Cho một viên nén dài.

Cetirizin hydroclorid	10 mg
Tinh bột	42,9 mg
Lactose	83,2 mg
Povidon	2,6 mg
Colloidal anhydrous silica	1,1 mg
Talc	3 mg
Magnesi stearat	2,2 mg

DƯỢC LỰC HỌC:

Cetirizin là thuốc kháng Histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng nhưng không gây buồn ngủ ở liều dược lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H₁ nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng Acetylcholin và không có tác dụng đối kháng Serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian Histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Nồng độ đỉnh máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liều 10mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể. Độ thanh thải ở thận là 30ml/phút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên kết mạnh với Protein huyết tương (khoảng 93%).

CHỈ ĐỊNH:

Cetirizin được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mãn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi và viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ em trên 12 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Những người có tiền sử dị ứng với Cetirizin, với Hydroxyzin.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

- Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 10mg/lần/ngày.
- Người bệnh có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11 - 31ml/phút) người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là 5mg/lần/ngày.

THẬN TRỌNG:

- Cần điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm phân thận nhân tạo.
- Cần điều chỉnh liều ở người suy gan.
- Ở một số người bệnh sử dụng Cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy vì dễ gây nguy hiểm.
- Tránh dùng đồng thời Cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, vì làm tăng thêm tác dụng của thuốc này.





SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: Tuy Cetirizin không gây quái thai ở động vật nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không dùng khi có thai.
- Thời kỳ cho con bú: Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Cho đến nay chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải Cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng 400mg Theophylin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Ở một số người bệnh sử dụng Cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

* Thường gặp:

- Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỷ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.
- Mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

* Ít gặp:

Chán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đở bụng, tăng tiết nước bọt.

* Hiếm gặp:

Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm cầu thận.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

- Triệu chứng của quá liều là: Ngủ gà ở người lớn, ở trẻ em có thể bị kích động.
- Cách xử trí: Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30⁰C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng thuốc quá hạn.

HÌNH THỨC – CÁCH TRÌNH BÀY:

Ép trong vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng trong thùng carton.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Thuốc SX theo : TCCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

322 - Lý Văn Lâm - P1 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780 3831133 * FAX : 0780 3832676



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

