

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/1/2013

llh

60 Caps. (12 x 5 Caps.)

Soft Capsule

**L-CYSTINE**



60 Viên  
(12 X 5 Viên)

**L-CYSTINE**

Viên nang mềm

ĐƯỢC XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐƯỢC KỸ HUỐNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



**Thành phần:** Mỗi viên chứa L-Cystine.....500mg

**Chỉ định:** Hỗ trợ chỉ định trong các trường hợp:

- Viêm da do thuốc.
- Sạm da, tàn nhang, sạm nắng...
- Eczema, mề đay, phát ban da và mụn trứng cá.
- Các bệnh biểu bì làm mỏng, tóc khô giòn dễ gãy.

**Liều lượng, cách dùng, chống chỉ định & tác dụng không mong muốn:** Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

**Đóng gói:** 5 viên x 12 vỉ/hộp

**Bảo quản:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

**PHILINTER PHARMA**  
Sân xuất tại:  
CTY TNHH PHILINTER PHARMA  
26, đường số 8, KCN Việt Nam,  
Singapore, Bình Dương



60 Caps.  
(12 X 5 Caps.)

**L-CYSTINE**

Soft Capsule

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING

**Composition:** Each caps. contains L-Cystine.....500mg

**Indications:** Adjunctive treatment in case of:

- Drug-induced dermatitis.
- Pigmentation of chloasma, ephelis, sunburn....
- Eczema, urticaria, skin rash and acne.
- Epidermal symptoms of splitting nail, toenail and hair.

**Dosage, administration, contra-indications & adverse effects:** See insert paper


**Package:** 5 caps x 12 blisters/box

**Storage:** In a hermetic container, below 30°C, protect from light



SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:





**L-CYSTINE**  
SOFT CAP.  
L-Cystine.....500mg  
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

**L-CYSTINE**  
SOFT CAP.  
L-Cystine.....500mg  
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

**L-CYSTINE**  
SOFT CAP.  
L-Cystine.....500mg  
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

**L-CYSTINE**  
SOFT CAP.  
L-Cystine.....500mg  
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

**L-CYSTINE**  
SOFT CAP.  
L-Cystine.....500mg  
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

*nh*

Số lô SX, HD sẽ dập nổi trên vỉ

**TP. ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG**



*nh*

**LIỆU THANH HIỆU**

TÉ  
01

*Để xa tâm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

## L-CYSTINE

SĐK: .....



**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

*Hoạt chất:* L-cystine ..... 500mg

*Tá dược:* Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, dầu lecithin, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, nước tinh khiết.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm.

### CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ chỉ định trong các trường hợp:

- Viêm da do thuốc.
- Sạm da, tàn nhang, sạm nắng...
- Eczema, mề đay, phát ban da và mụn trứng cá.
- Các bệnh biểu bì làm móng, tóc khô giòn dễ gãy.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: Liều dùng thông thường là 2-4 viên/ngày. Có thể dùng liên tục L-CYSTINE trong thời gian 10-20 ngày mỗi tháng.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.

### THẬN TRỌNG

- Nếu xảy ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, ngứa, chán ăn và khó chịu ở bụng, nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Tuân theo đúng liều dùng được đề nghị.
- Trong trường hợp dùng thuốc đối với trẻ em phải có sự hướng dẫn của người lớn. Không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Nếu thuốc không có hiệu quả sau khi dùng 2 tuần, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

### CẢNH BÁO

- Không nên dùng L-CYSTINE cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng và hôn mê gan.
- Thận trọng khi dùng L-CYSTINE cho những bệnh nhân bị cystine niệu.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật sự cần thiết và dưới sự theo dõi của bác sĩ.

### ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Cho đến nay, chưa có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo.

*\* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

### SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
**\* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.\***  
**ĐÓNG GÓI:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.

*Handwritten signature*



*Sản xuất bởi*  
**CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA**  
Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Thanh*

