

PROSPAN® FORTE



Thuốc ho



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc
dược sĩ

Thuốc ho PROSPAN® FORTE

Tiêu nhầy – chống co thắt – giảm ho

Không chứa cồn • Không chứa đường

Không chứa phẩm màu

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml dung dịch chứa:

Hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (*Hederae helicis folii extractum siccum*)...35 mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) : 1].

Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbat, acid citric khan, gồm xanthan, dung dịch sorbitol, hương frescofort, hương cam, levomenthol.

CHỈ ĐỊNH:

Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho. Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose.

THẬN TRỌNG:

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rất hiếm: Phản ứng dị ứng (khó thở, sưng, da bị mẩn đỏ, ngứa) có thể xảy ra sau khi dùng thuốc chứa cây thường xuân.

Prospan® Forte cũng có thể gây tác dụng nhuận tràng do thuốc chứa sorbitol.

Không phổ biến: Ở những bệnh nhân nhạy cảm, tác dụng phụ trên đường tiêu hoá có thể xảy ra (buồn nôn, nôn, tiêu chảy).

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống thuốc chung Prospan® Forte với các thuốc khác có gây những tác dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan® Forte đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh là an toàn.

Lưu ý đặc biệt:

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Prospan® Forte có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu sắc và hương vị của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ, liều dùng thông thường là:

Tuổi	Liều đơn	Tổng số liều hàng ngày
Từ 12 tuổi trở lên	5ml/lần	15 ml (5 ml/lần x 3 lần/ngày)
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi	5ml/lần	10 ml (5 ml/lần x 2 lần/ngày)
Trẻ dưới 6 tuổi	Dùng theo chỉ định của bác sĩ	

CÁCH DÙNG

Uống thuốc ho Prospan® Forte (không pha loãng) vào buổi sáng, (buổi trưa) và buổi tối.

Lấy dung dịch với cốc đo kèm theo.

Lắc chai trước khi sử dụng!

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ. Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dẳng và xuất hiện tình trạng khó thở, sốt, đàm có mủ hoặc máu, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

BẢO QUẢN:

Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

3 năm kể từ ngày sản xuất.
Sau khi mở nắp thuốc có thể sử dụng trong vòng 90 ngày. Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 100ml, hộp 1 chai 200ml.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:


Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.

Sản xuất bởi:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, CHLB Đức

Xuất xứ: CHLB Đức



Nhà nhập khẩu & phân phối:
Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco. Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.