

SORBITOL

(Hộp 25 gói x 5g)


457/152

1/ Nhãn gói:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17 / 12 / 2015

Thuốc bột
SORBITOL
Gói 5g



Mipharmco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322 Lý Văn Lâm - Phường 1 - TP. Cà Mau

THÀNH PHẦN:
Sorbitol 5g

CHỈ ĐỊNH:
- Thuốc được dùng để hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến rối loạn chức năng tiêu hóa gan, mật.
- Điều trị chứng táo bón và khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các bệnh thủng dạ dày ruột non, viêm loét đại-trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chửa rỗng nguyên nhân khác, người bệnh không dung nạp fructose do di truyền.

CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG:
- Điều trị triệu chứng khó tiêu: Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu, người lớn dùng 1-3 gói mỗi ngày.
- Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em dùng ½ liều người lớn.
*Chỉ chỉ: Pha 1 gói trong ½ cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

ĐƯỢC QUẢN LÝ DƯỢC HỌC VÀ DƯỢC LÝ TẠI VIỆT NAM

SDK: Ngày sx: Hạn dùng:



2/ Nhãn hộp:

Hộp 25 gói x 5g

SORBITOL
Thuốc bột

Thuốc bột **GMP-WHO**

SORBITOL
MIPHARMCO

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322 Lý Văn Lâm - P.1, TP. Cà Mau

THÀNH PHẦN:
Sorbitol 5g

CHỈ ĐỊNH:
- Thuốc được dùng để hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến rối loạn chức năng tiêu hóa gan, mật.
- Điều trị chứng táo bón và khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các bệnh thủng thể viêm ruột non, viêm loét đại-trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chửa rỗng nguyên nhân, những người bệnh không dung nạp fructose do di truyền.
Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn kèm theo

THUỐC SX THEO: TCOS
SDK:

Thuốc bột

SORBITOL
MIPHARMCO

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322 Lý Văn Lâm - P.1, TP. Cà Mau

CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG:
- Điều trị triệu chứng khó tiêu:
Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu, người lớn dùng 1-3 gói mỗi ngày.
- Điều trị táo bón:
Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em dùng ½ liều người lớn.
*Chỉ chỉ: Pha 1 gói trong ½ cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

ĐƯỢC QUẢN LÝ DƯỢC HỌC VÀ DƯỢC LÝ TẠI VIỆT NAM

SDK: Ngày sx: Hạn dùng:

BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C. NƠI KHÔ MÁT, TRÁNH ÁNH SÁNG ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG



MẪU TOA HƯỚNG DẪN

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

SORBITOL

THÀNH PHẦN: Cho một gói.

Sorbitol 5 g

DƯỢC LỰC HỌC:

- Sorbitol là một rượu có nhiều nhóm Hydroxyl, có vị ngọt bằng 1/2 đường mía. Thuốc thúc đẩy sự Hydrat- hóa các chất chứa trong ruột.
- Sorbitol kích thích tuyến cholecystokinin- pancreazymin và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.
- Sorbitol chuyển hóa chủ yếu ở gan thành fructose, một phản ứng được xúc tác bởi Sorbitol dehydrogenase. Một số Sorbitol có thể chuyển đổi thẳng thành glucose nhờ aldose reductase.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, sau khi uống hoặc đặt trực tràng.
- Một phần rất nhỏ Sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO₂ khi thở ra trong quá trình hô hấp.

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc được dùng để hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến rối loạn chức năng tiêu hóa gan, mật. Điều trị chứng táo bón và khó tiêu.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:

- Điều trị triệu chứng khó tiêu: Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu, người lớn 1-3 gói mỗi ngày.
- Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em dùng 1/2 liều người lớn

* Ghi chú: Pha 1 gói trong 1/2 cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại- trực tràng.
- Bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc.
- Hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Những người bệnh không dung nạp fructose do di truyền.

THẬN TRỌNG:

- Trong trường hợp tắc đường dẫn mật.
- Người bệnh đại tràng kích thích tránh dùng Sorbitol khi đói và nên giảm liều.
- Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón Sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa tìm thấy tài liệu trong dược thư.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa tìm thấy tài liệu trong dược thư.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây tiêu chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có đại tràng kích thích hoặc trường bụng.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

- Triệu chứng: Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều lần và lặp lại.
- Xử trí: Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

BẢO QUẢN:

Nhiệt độ dưới 30⁰C. Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Không dùng thuốc quá hạn.

HÌNH THỨC – CÁCH TRÌNH BÀY:

Ép trong gói, mỗi gói 5 g, hộp 25 gói. Có toa hướng dẫn kèm theo, đóng trong thùng carton.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
Thuốc SX theo : TCCS**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322 - Lý Văn Lâm - P1 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780 3831133 * FAX : 0780 3832676



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Nguyễn Thị Thu Thủy



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the main text.

