



NattoEnzym 1000

Nattokinase 1000 FU

あかいまい

Giúp giảm nguy cơ
hình thành cục máu đông
Nguyên liệu Nhật Bản



THÀNH PHẦN:

Hàm lượng trong 1 viên
Nattokinase ... 1000 FU

Chất độn (microcrystallin cellulose M112 -
INS 460 (i)), chất làm trơn (magnesi stearat
- INS 470 (iii)).

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối,
giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị huyết khối gây tắc nghẽn mạch
máu.

Người có nguy cơ bị huyết khối.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần: sáng 1 viên, tối 1 viên.

Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau
khi ăn 1 giờ.

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 6,6 g (Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng)

Hộp 19,8 g (Hộp 1 chai x 60 viên nang cứng)

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản
xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản
phẩm.

LƯU Ý:

Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi,
phụ nữ có thai và đang cho con bú.
Ngưng sử dụng trước khi phẫu thuật.
Thận trọng khi dùng cho phụ nữ trong
giai đoạn hành kinh, những người máu
chậm đông hoặc đang chảy máu cấp
tính, không dùng cho người tai biến do
đứt mạch máu.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không
quá 30°C, tránh ánh sáng.

*Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc,
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho người mẫn cảm với
bất cứ thành phần nào của sản phẩm.*

Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: (0292) 3891433 | Fax: (0292) 3895209

www.dhgpharma.com.vn - Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn