

Mẫu nhãn hộp viên nang mềm EBLAMIN

EBLAMIN[®]
Cao khô *Carduus marianus* 95% (k/k) 200 mg




Hộp 12 Vi x 5 Viên nang mềm

Hộp 12 Vi x 5 Viên nang mềm

EBLAMIN[®]
Cao khô *Carduus marianus* 95% (k/k) 200 mg

"ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"
"ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM"

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY CP KOREA UNITED PHARM. INT'L
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/-07-2018

Kích thước : 13 cm x 9 cm x 6 cm
Tỷ lệ: 75%

Box of 12 Blisters x 5 Soft Caps.

EBLAMIN[®]
Extractum *Carduus marianus* 95% (w/w) 200 mg

"READ INSERT-PAPER CAREFULLY BEFORE USING"
"KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN"

Supportive treatment in administration of liver disease, chronic hepatitis, hepatic cirrhosis
Relief of symptoms of indigestion and upset stomach

MANUFACTURED BY
KOREA UNITED PHARM. INT'L JSC
THUAN AN, BINH DUONG, VIETNAM

Số lô SX :
Ngày sản xuất :
Hạn dùng :
Số đăng ký :




EBLAMIN[®]
Extractum *Carduus marianus* 95% (w/w) 200 mg
(Equivalent to Silymarin 140 mg, Silybin 60 mg)

(MÔ TẢ) Viên nang mềm hình thuẫn dài, màu đỏ sẫm, bên trong chứa dịch thuốc màu vàng nâu.

(CHỈ ĐỊNH) Hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm độc gan, làm vệ vi mô gan khi dùng các chất gây độc cho gan, viêm gan mãn tính, xơ gan.
Làm giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG
Liều dùng thông thường cho người lớn: mỗi lần 1 viên nang, 2-3 lần/ngày.
Liều dùng có thể thay đổi theo tuổi và tình trạng của bệnh nhân.



(CHỐNG CHỈ ĐỊNH & TÁC DỤNG PHỤ)
Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
(TIÊU CHUẨN) TCS.
(BẢO QUẢN) Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.
(ĐÓNG GÓI)
5 Viên nang mềm/Vx 6 Vi (tủ nhôm x 2 Tủ nhôm)/Hộp.
Các thông tin khác, xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY CP KOREA UNITED PHARM. INT'L
THUAN AN, BINH DƯƠNG, VIỆT NAM

For full prescribing information, please see enclosed leaflet.


Manufactured by
KOREA UNITED PHARM. INT'L JSC
No. 24, Dong Bach Street, Suoi Hoa Suburb, Thuat An, Binh Duong, Vietnam.

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L
Korea, Young Sun
Deputy General Director

Mẫu nhãn vỉ viên nang mềm EBLAMIN

Số lô SX, hạn dùng được in nổi lên vỉ



Kwon Young Sam
Deputy General Director

Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int'l
Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

EBLAMIN - Viên nang mềm

Cao khô *Carduus marianus* 95% (kl/kl) 200 mg



THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô *Carduus marianus* 95% (kl/kl).....200 mg

(*Carduus marianus* L. Gaertn.)

(Tương đương Silymarin 140 mg; Silybin 60 mg)

Tá dược: Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Lecithin, Dầu cọ, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Dung dịch sorbitol, Glycin, Acid citric khan, Methyl para-hydroxybenzoat, Propyl para-hydroxybenzoat, Ethyl vanilin, Màu xanh số 1 (Brilliant Blue FCF), Màu đỏ số 40 (Allura red AC), Titan dioxyd.

MÔ TẢ

Viên nang mềm hình thuôn dài, màu đỏ sẫm, bên trong chứa dịch thuốc màu vàng nâu.

CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm độc gan, bảo vệ tế bào gan khi dùng các chất gây độc cho gan, viêm gan mãn tính, xơ gan.

Làm giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng thông thường cho người lớn: mỗi lần 1 viên nang, 2 – 3 lần/ ngày.

Liều dùng có thể thay đổi theo tuổi và tình trạng của bệnh nhân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc ở những bệnh nhân sau:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân bị tắc đường mật.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người bị bệnh tiểu đường.

THẬN TRỌNG

Phụ nữ có thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến Bác sĩ hay Dược sĩ trước khi sử dụng thuốc.



Ngưng sử dụng thuốc và thông báo cho Bác sĩ hay Dược sĩ khi xảy ra triệu chứng:

- Đau dạ dày hoặc tiêu chảy.
- Các biểu hiện dị ứng với thuốc.

Khi sử dụng thuốc:

- Không nên dùng thuốc quá liều chỉ định.
- Hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ nếu bệnh nhân bị vàng da.
- Nếu triệu chứng bệnh không được cải thiện sau thời gian dài sử dụng thuốc, hay sau 1 tháng, cần hỏi lại ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không dùng chung với levodopa.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiếm khi xảy ra các trường hợp rối loạn tiêu hóa và ban da dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có thông tin về việc sử dụng thuốc an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Triệu chứng: Thuốc không độc ngay cả khi dùng với liều cao. Khi quá liều có thể làm gia tăng các tác dụng không mong muốn và có thể gây nhuận tràng nhẹ.

Xử trí: Không cần điều trị đặc biệt, các triệu chứng trên nói chung sẽ hết trong vòng 24 đến 48 giờ khi ngưng dùng thuốc.

ĐÓNG GÓI

5 Viên nang mềm/ Vi x 6 Vi/ Túi nhôm x 2 Túi nhôm/ Hộp.

BẢO QUẢN

Trong bao bì kín, tránh ánh sáng. Ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.



TIÊU CHUẨN

TCCS.

Để xa tầm tay của trẻ em.


Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM. INT'L

Số 2A, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.


Phó Tổng Giám Đốc
Cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

