

241/83

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG THUỐC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

01/10/2013

Composition: Each capsule contains
Erdosteine 300.0mg

**Indication, Contraindication, Dosage & Administration, Precaution,
Side effect and other information:**
Please see insert paper.

Specification: In house

Storage: store in hermetic container under 30°C, protect from light


**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY INSERT PAPER BEFORE USE**

Số ĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
DNKK :

Rx Prescription Drug 3 blisters x 10 caps

MUFPHY cap.

Erdosteine 300mg



Manufactured by:
Jin Yang Pharm Co., Ltd
649-3, Choji - dong, Ansan - si, Kyunggi - do, Korea

Thành phẩm: Mỗi viên nang có chứa
Erdosteine 300.0mg

**Chỉ định, chống chỉ định, Liều lượng & cách dùng, thận trọng, tác dụng
ngoại ý và các thông tin khác:**
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Bao quản: bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, dưới 30°C

**ĐỂ THUỐC XA TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Rx Thuốc bán theo đơn 3 vỉ x 10 viên nang


MUFPHY cap.


Erdosteine 300mg



Sản xuất bởi:
Jin Yang Pharm Co., Ltd
649-3, Choji - dong, Ansan - si, Kyunggi - do, Hàn Quốc

mlc





Rx - Thuốc bán theo đơn

Đề xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

MUFPHY

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:

Hoạt chất: Erdosteine 300mg

Tá dược: Microcrystalline cellulose, Povidone K-30, Magnesium stearate

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Đặc tính dược lực học:

Erdosteine có tác dụng ổn định sự tiết chất nhầy, có tác dụng làm loãng đờm, dễ dàng khạc đờm ra.

Erdosteine có tác dụng bảo vệ phế quản, bảo vệ enzyme α 1-antitrysin, làm tăng lượng kháng thể IgA trong máu. Do đó, Erdosteine có tác dụng bảo vệ phế quản, tăng khả năng chống lại vi khuẩn.

Ưu điểm của Erdosteine so với các chất thuộc nhóm thiol khác là các thuốc ít gây kích ứng dạ dày do nhóm thiol (SH) trong phân tử đã bị khóa bởi các nhóm khác.

Đặc tính dược động học:

Các thông số dược động học của Erdosteine vẫn chưa đầy đủ.

Một số các nghiên cứu trên thanh niên tình nguyện khỏe mạnh đã chỉ ra rằng, với một nồng độ thấp được tìm thấy trong huyết tương. Khoảng 64.5% lượng Erdosteine được liên kết với proteine huyết tương. Có 3 chất chuyển hóa được xác định trong huyết thanh.

Erdosteine thải trừ chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng chất liên hợp với sulfate. Thức ăn ít ảnh hưởng đến sự hấp thu, chuyển hóa và thải trừ của Erdosteine.

Không có bằng chứng về sự tích lũy của Erdosteine và các chất chuyển hóa của nó khi dùng liều lặp lại.

Chỉ định:

Mufphy được chỉ định làm loãng đờm trong các trường hợp bệnh hô hấp cấp và mạn tính ở người lớn.

Liều dùng và cách sử dụng:

Uống 1 viên/1 lần, uống 2 lần/ngày, tối đa 10 ngày.

Thuốc này chỉ được dùng theo đơn của bác sĩ.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân xơ gan thiếu enzyme systathionine-synthase.

Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải Creatinine < 25ml/phút). Phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng:

Các trường hợp sau đây cần hết sức thận trọng khi sử dụng:

- Bệnh nhân loét dạ dày.
- Bệnh nhân có bệnh thận và gan.
- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi.

Tác dụng phụ:

Các tác dụng không mong muốn hiếm gặp (ít hơn 0.01% tổng số người sử dụng)

Đau dạ dày, khó thở, ho, ỉa chảy, eczema, đau đầu, nôn, ban đỏ ngoài da, thay đổi vị giác, nôn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



Tương tác với thuốc khác:

Chưa có các báo cáo về tương tác của Erdosteine với các thuốc.

Có thể phối hợp Erdosteine với các kháng sinh và các thuốc giãn phế quản (như Theophylline, các thuốc kích thích thụ thể β_2 -adrenergic, thuốc giảm ho.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Do chưa đủ các dữ kiện an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, do đó chống chỉ định khi dùng cho hai đối tượng này.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Do thuốc có tác dụng phụ gây ra đau đầu, chóng mặt, cần thận trọng khi dùng cho các công việc đòi hỏi sự tỉnh táo như lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều:

Chưa có dữ kiện khi quá liều Erdosteine. Không nên dùng quá liều được chỉ định, trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được chăm sóc triệu chứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất bởi:

JIN YANG PHARM. CO., LTD

649-3, Choji-dong, Ansan-si, Kyunggi-do, Korea



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

