

NHÃN THUỐC

1. Nhãn trên vỉ 10 viên

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8/11/2013



Số lô SX,
HD : in chìm trên vỉ

2. Nhãn trên hộp giấy 06 vỉ x 10 viên



Đà Nẵng ngày 08 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Viên nang
Rx IMODULIN
(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

Thành phần : Cho 1 viên nang

- Thymomodulin..... : 80 mg
- Tá dược (Tinh bột mì, Lactose monohydrat , Povidon K30, Magnesi stearat , Aerosil, Talc) vừa đủ..... : 1 viên

Tác dụng dược lý:

Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

Dược động học:

Thymomodulin hấp thu tốt theo đường uống và đạt nồng độ đỉnh sau khi uống từ 2 đến 6 giờ, duy trì tác dụng trong suốt 12 giờ và bị đào thải sau 48 giờ.

Chỉ định:

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.
- Viêm mũi dị ứng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.
- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

Liều dùng - Cách dùng : Theo chỉ định của Bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là :

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn với liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian từ 4-6 tháng.
- Viêm mũi dị ứng liều dùng 120mg/ngày trong thời gian 4 tháng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn với liều dùng 120mg/ngày, trong thời gian từ 3-6 tháng.
- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS với liều dùng 60mg/ngày trong thời gian 50 ngày.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi với liều dùng 160mg/ngày thời gian 6 tuần.

Chống chỉ định :

Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn :

Thuốc rất ít tác dụng phụ, nếu có chỉ là các phản ứng dị ứng thông thường: rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đi ngoài...với tần suất nhỏ (đối với các bệnh nhân nhạy cảm với thuốc)

*** Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Quá liều và xử trí:

- Nghiên cứu cho thấy thuốc có ít hoặc không có độc tính khi dùng liều cao.
- Nếu triệu chứng quá liều xảy ra, chủ yếu điều trị triệu chứng.

Tương tác thuốc :

Các peptide hoặc các dẫn xuất protein mạch ngăn từ tuyến ức dùng phối hợp với các thuốc hóa trị từ tuyến ức được dùng cho những bệnh nhân bị ung thư. Một nghiên cứu khi dùng phối hợp Thymomodulin với hóa trị liệu, cho thấy làm giảm vài tác dụng không mong muốn của hóa trị liệu và tăng thời gian sống sót so với khi chỉ dùng hóa trị liệu.



Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú :

Chưa được nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:

Có thể sử dụng được cho người thường xuyên lái xe và vận hành máy móc.

Khuyến cáo :

- Không dùng thuốc quá hạn, hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.
- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ.**
- **Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.**

Trình bày và bảo quản :

- Thuốc đóng trong vỉ 10 viên nang, hộp 6 vỉ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**
- Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: Info@danapha.com

Số điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 5 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

