

269 / 0798

Hộp Alverin-US: 102 x 20 x 45

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 08/11/2014

Rx Prescription drug

WHO GMP

ALVERIN-US

Alverin citrat 40 mg



3 blisters x 10 tablets

Keep out of reach of children
Read the package insert carefully before use.

ALVERIN-US
Alverin citrat 40 mg

Thành phần:

Mỗi viên nén chứa:
Alverin citrat..... 40 mg
Tá dược v.d..... 1 viên.

Bảo quản:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.



CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN
Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn cơ sở

Rx Thuốc bán theo đơn

WHO GMP

ALVERIN-US

Alverin citrat 40 mg



3 vỉ x 10 viên nén

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SPK (Reg. No.):
Số SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HD (Exp.):

Composition:

Each tablet contains:
Alverin citrat..... 40 mg
Excipients q.s..... 1 tablet.

Storage:

In a dry and cool place, below 30°C,
protect from direct sunlight.



US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Manufacturer:
Lot B1-10, Đường D2, KCN
Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.

Indications, contra-indications, dosage, administrator:

Please refer to enclosed package insert.

Specification:

In house

Vỉ Alverin-US: 96 x 42



Hộp Alverin-US: 102 x 45 x 65 mm



Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Alverin citrat..... 40 mg

Tá dược v.d..... 1 viên.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

US PHARMA USA
Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.

Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd.):
HD (Exp.):



Composition: Each tablet contains:

Alverin citrat..... 40 mg

Excipients q.s..... 1 tablet.

Indications, contra-indications, dosage, administration:

Please refer to enclosed package insert.

Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

Specification: In house

US PHARMA USA
Manufacturer: US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.

Độc ký hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Vỉ Alverin-US: 96 x 42





Rx Thuốc bán theo đơn

ALVERIN-US

Viên nén Alverin Citrat 40 mg

Thành phần

Mỗi viên nén chứa:

Alverin Citrat 40 mg

Tá dược: Lactose monohydrate, Polyvinyl pirrolidon (PVP) K30, Natri starch glycolate, Colloidal silicon dioxyd (Aerosil), Magnesi stearat.

Phân loại

ALVERIN-US chứa Alverin Citrat, thuộc nhóm chống co thắt cơ trơn loại papaverin.

Dược lực và cơ chế tác dụng

Alverin là thuốc chống co thắt, tác dụng trực tiếp lên cơ trơn đường tiêu hóa và tử cung. So với papaverin, tác dụng mạnh hơn gấp 3 lần nhưng độc tính kém 3 lần.

Dược động học

Alverin citrat hấp thu qua đường tiêu hóa sau khi uống và chuyển hóa nhanh thành dạng có hoạt tính, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được khoảng 1 - 1,5 giờ sau khi uống. Các chất chuyển hóa được bài tiết trong nước tiểu theo cơ chế thải trừ chủ động qua thận.

Chỉ định

- Điều trị triệu chứng các biểu hiện đau do rối loạn chức năng đường tiêu hóa và đường mật.
- Điều trị các biểu hiện đau hay co thắt vùng tiết niệu - sinh dục.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và đường dùng

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị. Liều thông thường cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống thuốc với một ít nước, 1-3 viên/lần, 3 lần/ngày.

Cách dùng

Dùng đường uống.

Chống chỉ định

- Phụ nữ đang nuôi con bú.
- Người bị huyết áp thấp.
- Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.
- Bệnh nhân bị tắc ruột, liệt ruột.
- Đau bụng không rõ nguyên nhân

Thận trọng

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng cho phụ nữ mang thai mặc dù nghiên cứu thực nghiệm trên súc vật chưa cho thấy tác dụng gây quái thai hoặc tác dụng độc hại đối với phôi thai.

Thời kỳ cho con bú



Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú

Lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe

Tương tác thuốc

Chưa có tương tác thuốc nào của alverin được báo cáo. Tuy nhiên để tránh tương tác thuốc xảy ra với các thuốc khác, phải báo với bác sĩ hoặc dược sĩ biết những thuốc bạn đang dùng.

Tác dụng phụ

ALVERIN-US được dung nạp tốt, tác dụng phụ thường hiếm gặp và thoáng qua. Có thể có đau đầu, khô miệng, yếu cơ, chóng mặt và tăng huyết áp.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều

Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Rửa dạ dày. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Dạng trình bày

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn

Nhà sản xuất.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.


Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861,

Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng

