

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/11/2018

Thành phần:

Lộc nhung	500 mg
Nhân sâm	500 mg
Hoàng kỳ	500 mg
Đương quy	500 mg
Liên nhục	400 mg
Trần bì	300 mg
Mẫu lệ	350 mg
Nhục thung dung	500 mg
Cao đặc dược liệu (W=20%)	352 mg
Tổng lượng 2,25 g hỗn hợp dược liệu	
Hoài sơn	300 mg
Bạch truật	350 mg
Sơn thù	400 mg
Sơn thù	500 mg
Hoàng bá	300 mg
Ba kích	400 mg
Tá dược vừa đủ	6 g

CHI ĐỊNHH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Số lô SX: _____
HD: _____



Khởi Dương Hoàn
Túi 6 g hoặc ống
Nhà sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THẾ THAO
69 Trần Phú-P.Lam Sơn-TP.Thanh Hóa
MSCS: 26A 800942

THÀNH PHẦN:

Lộc nhung	500 mg
Nhân sâm	500 mg
Hoàng kỳ	500 mg
Đương quy	500 mg
Liên nhục	400 mg
Trần bì	300 mg
Mẫu lệ	350 mg
Nhục thung dung	500 mg
Cao đặc dược liệu (W=20%)	352 mg
Tổng lượng 2,25 g hỗn hợp dược liệu	
Ngũ vị tử	300 mg
Hoài sơn	350 mg
Bạch truật	400 mg
Sơn thù	500 mg
Hoàng bá	300 mg
Ba kích	400 mg
Tá dược vừa đủ	6 g

Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỀ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

KHỞI DƯƠNG HOÀN



Cs. Cổ Truyền

CHI ĐỊNHH: Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, dị tật, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

Thao hợp đồng với:
CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC HỌC CỔ TRUYỀN THẾ THAO
Văn phòng: 69 Trần Phú - P. Lam Sơn - TP. Thanh Hóa
Điện thoại/Fax: 02373.852.432 - Di động: 0983.522.966

Sản xuất tại:
Nhà máy sản xuất thuốc Đông y độc quyền
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
LÔ 45-4 KCN TÂY BẮC GIÀ - TP. THANH HÓA
ĐIỆN THOẠI: 0237 3852881 - FAX: 0237 3724853



LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6.0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.
- Trẻ em 15 - 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g - 6.0g)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật do sốt cao
- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.
- Phụ nữ có thai.
- Người bị tiểu đường

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô SX: _____
NSX: _____
HD: _____

KHỞI DƯƠNG HOÀN



Cs. Cổ Truyền

CHI ĐỊNHH: Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, dị tật, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017
CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC GIAM ĐỐC TÀI THẾ THAO
69 Trần Phú-P.Lam Sơn-TP.Thanh Hóa
MSCS: 26A 800942

MÀU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC	Hộp 15 túi x 6 g										
KHỞI DƯƠNG HOÀN											
SẢN PHẨM	Hộp (120 x 72 x 90)mm Túi (78 x 68)mm										
KÍCH THƯỚC											
MÀU SẮC	<table border="0"> <tr><td>C-0</td><td>C-0</td></tr> <tr><td>M-75</td><td>M-50</td></tr> <tr><td>Y-80</td><td>F-100</td></tr> <tr><td>K-80</td><td>K-10</td></tr> <tr><td></td><td>P-0</td></tr> </table>	C-0	C-0	M-75	M-50	Y-80	F-100	K-80	K-10		P-0
C-0	C-0										
M-75	M-50										
Y-80	F-100										
K-80	K-10										
	P-0										

HOÀNG VĂN BÌNH



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tên sản phẩm: **KHÔI DƯƠNG HOÀN**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ

CÔNG TY SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC
SN 69 Trần Phú-P.Lam Sơn
MSCS: 2 6 A 8 1

2. Thành phần: Cho 1 túi x 6 gam

Hoạt chất	Hàm lượng
Lộc nhung (<i>Cornu cervi pantotrichum</i>)	500 mg
Nhân sâm (<i>Radix ginseng</i>)	500 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	500 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	500 mg
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis Ruciferae</i>)	400 mg
Trần bì (<i>Pericarpium Citri Reticulatae Perenne</i>)	300 mg
Mẫu lệ (<i>Concha Ostreae</i>)	350 mg
Nhục thung dung (<i>Herba Cistanches</i>)	500 mg
Cao đặc dược liệu (W=20%) tương ứng 2,25 g hỗn hợp dược liệu:	352 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	300 mg
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscorea Persimilis</i>)	350 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis Macrocephalae</i>)	400 mg
Son thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	500 mg
Hoàng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>)	300 mg
Ba kích (<i>Radix Morindae officinalis</i>)	400 mg
Tá dược vừa đủ	1 túi
<i>Tá dược gồm: Tinh bột sắn, Đường trắng, Bột talc, Than hoạt, Parafin rắn, Sáp ong trắng, Parafin lỏng</i>	

3. Mô tả sản phẩm: Viên hoàn cứng hình cầu, màu đen, nhẵn bóng, mùi thơm dược liệu. Vị hơi đắng.

4. Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 6 gam

5. Thuốc dùng cho bệnh gì:

Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, di tinh, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.

- Trẻ em 15 – 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g – 6,0g)

7. Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao

- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.

- Phụ nữ có thai.

- Người bị tiểu đường

8. Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo về tác dụng phụ.

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

- Chưa có thông tin.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bất thường khi sử dụng quá liều.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

- Nếu có xảy ra biểu hiện bất thường do dùng quá liều khuyến cáo, phải đến ngay cơ sở y tế để bác sĩ theo dõi và xử trí.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

a/ Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin.

b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.

- Phụ nữ cho con bú dùng được.

c/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

15. Khi nào cần tham vấn bác sĩ:

- Khi gặp bất kì tác dụng không mong muốn hoặc quá liều cần đến gặp ngay bác sĩ để tham vấn.

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

16. Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

TRU
-TP:
00



NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VITYT THANH HÓA

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

18. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Chỉ định:

Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, di tinh, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

2. Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.

- Trẻ em 15 – 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g – 6,0g)

3. Chống chỉ định:

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao

- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.

- Phụ nữ có thai.

- Người bị tiểu đường

4. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

a/ Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin.

b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.

- Phụ nữ cho con bú dùng được.

c/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

5. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

- Chưa có thông tin.

6. Tác dụng không mong muốn:


Chưa có báo cáo về tác dụng phụ.

7. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bất thường khi sử dụng quá liều.



Ngày 12 tháng 10 năm 2017



HOÀNG VĂN HÙNG

TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

THỂ THAO
nh Hóa
42

3

ĐT: 162852

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT : 0393854617 - Fax 0393856821

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 01 / 11 / 2018

Công thức cho 1 viên:
Cao Bạch quả (*Ginkgo Biloba Extract*) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần)80mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821
Sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN -TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh- Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

NSX:
Số lô SX:
HD:

RX thuốc bán theo đơn
GMP-WHO
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim



Compositions:
Ginkgo Biloba Extract (corresponding to total flavonoid 19,2mg).....80mg
Excipients q.s for..... 1 tablet
Indications, Contraindications, Dosage - Administration:
Refer to enclosed package insert
Storage: Store in dry place, below 30°C, Protect from light
Specifications: In-House standards
Keep out of reach of children, read enclosed leaflet carefully before use.

HATINH PHARMACEUTICAL J.S.C
167 Ha Huy Tap St, Ha Tinh City
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821



RX thuốc bán theo đơn
GMP-WHO
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT : 0393854617 - Fax 0393856821

MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Công thức cho 1 viên:
Cao Bạch quả (*Ginkgo Biloba Extract*) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) 80mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK:

NSX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821
Sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN -TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh-
Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

RX thuốc bán theo đơn
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

GMP-WHO

NEUROGILOBAN 80

NEUROGILOBAN 80

Ginkgo biloba Extract 80mg



HADIPHAR

Compositions:

Ginkgo Biloba Extract (corresponding to total flavonoid 19,2mg)... 80mg
Excipients q.s for..... 1 tablet

Indications, Contraindications, Dosage - Administration:

Refer to enclosed package insert

Storage: Store in dry place, below 30°C, Protect from light

Specifications: In-House standards

Keep out of reach of children, read enclosed leaflet carefully before use.

HATINH PHARMACEUTICAL J.S.C
167 Ha Huy Tap St, Ha Tinh City
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

HADIPHAR



Ginkgo biloba Extract 80mg

NEUROGILOBAN 80

GMP-WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

RX thuốc bán theo đơn

<p>NEUROGILOBAN 80 Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) ... 80mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh</p>	<p>NEUROGILOBAN 80 Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) ... 80mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh</p>	<p>NEUROGILOBAN 80 Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) ... 80mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh</p>	<p>NEUROGILOBAN 80 Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) ... 80mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh</p>
HADIPHAR	HADIPHAR	HADIPHAR	HADIPHAR
GMP -WHO	GMP -WHO	GMP -WHO	GMP -WHO
SDK:	SDK:	SDK:	SDK:

NEUROGILOBAN 80

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

RX thuốc bán theo đơn

GMP-WHO
100 Viên nén bao phim

NEUROGILOBAN 80

Ginkgo biloba Extract 80mg



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN -TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Công thức cho 1 viên:

Cao Bạch quả (Ginkgo Biloba Extract)
(tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần) ...80mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS


SDK:

NSX:

Số lô SX:

HD:

NEUROGILOBAN 80



Hộp 1 lọ 100 Viên nén bao phim

RX thuốc bán theo đơn

GMP-WHO

Hộp 1 lọ 100 Viên nén bao phim

NEUROGILOBAN 80

Ginkgo biloba Extract 80mg

Công thức: cho 1 viên

Cao Bạch quả (Ginkgo Biloba Extract)
(tương ứng với 19,2mg flavonoid toàn phần)...80mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK:.....
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:



Công ty Cp Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

RX thuốc bán theo đơn

GMP-WHO

Hộp 1 lọ 100 Viên nén bao phim

NEUROGILOBAN 80

Ginkgo biloba Extract 80mg

Compositions:

Ginkgo Biloba Extract (corresponding to total flavonoid 19,2mg)
...80mg

Excipients ... q.s

Indications, Contraindications, Dosage - Administration

Refer to enclosed package insert

Storage: Store in dry place, below 30C, Protect from light

Specifications: In-House standards

Keep out of reach of children, read enclosed leaflet carefully before use.



HADIPHAR



Công ty Cp Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN -TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Rx – Thuốc bán theo đơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: NEUROGILOBAN 80

2. Thành phần cấu tạo:

THÀNH PHẦN	HÀM LƯỢNG
Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2 mg flavonoid toàn phần)	80 mg
Tá dược: Lactose, magnesi carbonat, tinh bột mỳ, PVP, talc, magnesi stearat, PEG 6000, HPMC 606, HPMC 615, titan dioxyd, sunset yellow, brilliant blue vừa đủ một viên.	

3. Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

4. Qui cách đóng gói:

01	Ép vỉ Al/PVC vỉ 10 viên x hộp 10 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ .
02	Lọ 100 viên/hộp

5. Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định:

Chỉ định:

Dùng điều trị triệu chứng trong thiếu năng tuần hoàn não nhẹ và vừa (hội chứng sa sút trí tuệ trong sa sút trí tuệ thoái hoá tiên phát, sa sút trí tuệ do tuần hoàn, và kết hợp của hai dạng) với những triệu chứng suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai và nhức đầu.

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống 1 viên/ lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: Uống 1 viên/ lần /ngày.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Pha cấp tai biến mạch máu, nhồi máu cơ tim, huyết áp thấp. Người đang xuất huyết, có rối loạn đông máu, phụ nữ có thai. Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

6. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

Người bị đau dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn.

Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có vấn đề gì xảy ra khi dùng thuốc với liều khuyến cáo hàng ngày.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng

7. Tương tác thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Không dùng cùng thuốc chống đông, thuốc gây đông máu, các vị thuốc có tác dụng chỉ huyết

8. Tác dụng không mong muốn (ADR):

Buồn nôn, ợ nóng (nhẹ và thoáng qua).

9. Quá liều và cách xử trí:

Chưa ghi nhận trường hợp quá liều.

Xử trí: Nếu có biểu hiện khi dùng quá liều khuyến cáo, ngừng dùng Neurogiloban 80.

10. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo khác của thuốc (Nếu có)

11. Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc:

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



(Handwritten signature)

12. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu, CCN – TTCN-
Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

13. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 05/5/2018
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



A blue ink signature at the bottom right of the page.

Rx – Thuốc bán theo đơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tên sản phẩm: NEUROGILOBAN 80

2. Khuyến cáo:

“ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

“ Để xa tầm tay trẻ em”.

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc:

THÀNH PHẦN	HÀM LƯỢNG
Cao Bạch quả (<i>Ginkgo Biloba Extract</i>) (tương ứng với 19,2 mg flavonoid toàn phần)	80 mg
Tá dược: Lactose, magnesi carbonat, tinh bột mỳ, PVP, talc, magnesi stearat, PEG 6000, HPMC 606, HPMC 615, titan dioxyd, sunset yellow, brilliant blue vừa đủ một viên.	

4. Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn bao phim màu nâu, cạnh và viên lạnh lặn.

5. Quy cách đóng gói:

01	Ép vỉ Al/PVC vỉ 10 viên x hộp 10 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ .
02	Lọ 100 viên/hộp

6. Thuốc dùng cho bệnh gì?:

Dùng điều trị triệu chứng trong thiếu năng tuần hoàn não nhẹ và vừa (hội chứng sa sút trí tuệ trong sa sút trí tuệ thoái hoá tiên phát, sa sút trí tuệ do tuần hoàn, và kết hợp của hai dạng) với những triệu chứng suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai và nhức đầu.

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?:

Người lớn: Uống 1 viên/ lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: Uống 1 viên/ lần /ngày.

8. Khi nào không nên dùng thuốc này ?:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Pha cấp tai biến mạch máu, nhồi máu cơ tim, huyết áp thấp. Người đang xuất huyết, có rối loạn đông máu, phụ nữ có thai. Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

9. Tác dụng không mong muốn:

Buồn nôn, ợ nóng (nhẹ và thoáng qua).

10. Tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?:

Không dùng cùng thuốc chống đông, thuốc gây đông máu, các vị thuốc có tác dụng chỉ huyết

11. Cần làm gì khi một lần quên thuốc:

Không thay đổi liều dùng cho lần tiếp theo, tiếp tục dùng thuốc cho hết đợt điều trị.

12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa ghi nhận trường hợp quá liều.

Xử trí: Nếu có biểu hiện khi dùng quá liều khuyến cáo, ngừng dùng Neurogiloban 80.

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:



(Handwritten signature)

Chưa ghi nhận trường hợp quá liều.

Xử trí: Nếu có biểu hiện khi dùng quá liều khuyến cáo, ngừng dùng Neurogiloban 80.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Người bị đau dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn.

Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có vấn đề gì xảy ra khi dùng thuốc với liều khuyến cáo hàng ngày.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Tham vấn bác sỹ, dược sỹ nếu gặp phải tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

“Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ”

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu, CCN – TTCN-
Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 05/5/2018.

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

**TUỢC CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh**