

MẪU NHÃN

1. NHÃN TRÊN CHAI :

GMP-WHO Mỗi chai 30ml Sirô chứa: Pseudoephedrin HCl..... 90mg Dextromethorphan HBr..... 45mg Chlorpheniramin maleat..... 6mg Natri Benzoat..... 300mg Tá dược vừa đủ..... 30ml SDK : Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS	Chai 30ml Rx-THUỐC BÁN THEO ĐƠN CONTUSSIN[®] Sirô	Chi định, liều lượng, cách dùng và chống chỉ định : Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản : Nơi khô, mát, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Ngày SX : Số lô SX : HD :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. NHÃN TRÊN HỘP GIẤY :

Chai 30ml

GMP-WHO
Rx-THUỐC BÁN THEO ĐƠN
Sirô CONTUSSIN[®]

CTY. CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Đường Sĩ Thành Khê, Tp. Đà Nẵng

Sirô CONTUSSIN
Mỗi chai 30ml Sirô chứa:
Pseudoephedrin HCl..... 90mg
Dextromethorphan HBr..... 45mg
Chlorpheniramin maleat..... 6mg
Natri Benzoat..... 300mg
Tá dược vừa đủ..... 30ml
SDK :
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Ngày SX :
Số lô SX :
HD :

Bottle 30ml

GMP-WHO
Rx-PRESCRIPTION DRUG
Sirup CONTUSSIN[®]

DANAPHA PHARMACEUTICAL JSC.
253 Đường Sĩ Thành Khê St., Đà Nẵng City, VN

Sirô CONTUSSIN
Chi định, liều lượng, cách dùng
và chống chỉ định :
Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn
sử dụng.
Bảo quản : Nơi khô, mát, tránh
ánh sáng.
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

8 934 901 830034

Đà Nẵng ngày 8 tháng 1 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC	
Sirô	
Rx Contussin[®]	
(Thuốc bán theo đơn)	
THÀNH PHẦN: Cho chai 30ml	
- Pseudoephedrin.HCl	: 90 mg
- Dextromethorphan.HBr	: 45 mg
- Chlorpheniramin maleat	: 6 mg
- Natri benzoate	: 300 mg
- Tá dược (Đường trắng, màu Amarant, Hương dâu, nước tinh khiết) vừa đủ	: 30 ml
DUỢC LỰC	
Pseudoephedrin có tác động giống giao cảm gián tiếp và trực tiếp và là một chất làm giảm sung huyết hữu hiệu ở đường hô hấp trên. Pseudoephedrin yếu hơn rất nhiều so với ephedrine về những tác dụng làm nhịp tim nhanh, tăng huyết áp tâm thu cũng như gây kích thích hệ thần kinh trung ương.	
Chlorpheniramin maleat có tác dụng kháng Histamin do ức chế thụ thể H1 nhờ đó làm giảm sự tiết nước mũi và chất nhầy ở đường hô hấp trên.	
Dextromethorphan.HBr là dẫn xuất của morphin có tác dụng ức chế trung khu ho, nhưng không gây ngủ, không gây nghiện và không ảnh hưởng đến nhu động ruột và sự tiết dịch đường hô hấp.	
CHỈ ĐỊNH: Điều trị những triệu chứng của các bệnh đường hô hấp trên như viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch, bệnh cảm và cúm thông thường.	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH	
- Bệnh nhân có tiền sử không dung nạp thuốc hay bất cứ thành phần nào của thuốc.	
- Bệnh nhân cao huyết áp nặng hay có bệnh mạch vành trầm trọng;	
- Bệnh nhân đã hay đang dùng các IMAO trong vòng 2 tuần trước đó. Dùng đồng thời Pseudoephedrin với loại thuốc này đôi khi có thể gây tăng huyết áp.	
- Không dùng cho những bệnh nhân sau : Bệnh nhân đang bị hoặc có nguy cơ bị suy hô hấp, các bệnh nhân ho kèm theo hen hoặc ho kèm theo đờm quá nhiều, bệnh nhân tăng nhãn áp, phì đại tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo.	
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Ngày 3 lần, tính theo muỗng cà phê (tương đương 5ml)	
Người lớn và trẻ em > 12 tuổi : 3 muỗng/lần.	
Từ 6 -12 tuổi : 2 muỗng/lần	
Từ 2 - 5 tuổi : 1 muỗng/lần	
Từ 6 tháng – < 2 tuổi : 1/4 – 1/2 muỗng/lần.	
THẬN TRỌNG	
Cần thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, cường giáp, rối loạn chức năng gan và/ hoặc thận.	
Thuốc có thể gây buồn ngủ và làm ảnh hưởng đến những xét nghiệm về thính giác.	



Tránh dùng cùng lúc với rượu hoặc các thuốc an thần tác động lên thần kinh trung ương.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Chưa xác định được tính an toàn khi sử dụng trong thai kỳ. Do đó, chỉ nên dùng thuốc khi lợi ích cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho bào thai. Đặc biệt, không nên dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kỳ, vì có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ sinh.

- Thuốc bài tiết qua sữa mẹ, nên cân nhắc quyết định ngưng cho con bú hay ngưng dùng thuốc.

NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI TÀU XE

Thuốc có thể gây ngủ gà, lơ mơ, cần tránh dùng cho người đang lái xe, vận hành máy móc, những người đang làm việc đòi hỏi cần sự tinh táo.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Dùng đồng thời với các tác nhân giống giao cảm (Các thuốc chống sung huyết, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc kích thích thần kinh trung ương) hay với các IMAO đôi khi có thể làm tăng huyết áp.

Không dùng chung thuốc an thần, rượu (có thể gây kích động ở trẻ em hoặc gây buồn ngủ).

Có thể làm đảo ngược một phần tác động của các thuốc can thiệp vào hoạt động giao cảm như brétylium, béthanidin, guanéthidin, métyldopa và các tác nhân ức chế α và β adrenergic.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Có thể xảy ra trường hợp ức chế hay hưng phấn hệ thần kinh trung ương với ngủ gà, choáng váng và chóng mặt là thường xuyên hơn cả.

Rất hiếm : Có thể thấy buồn nôn, nôn, chóng mặt và rối loạn tiêu hóa.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Triệu chứng: Buồn ngủ, tim nhanh, cao huyết áp, tăng hoạt động, kích thích, buồn nôn, nôn, mửa.

Xử trí: Cần áp dụng các biện pháp cần thiết để củng cố và duy trì hô hấp, kiểm soát các cơn co giật.

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.

- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Chế phẩm đóng trong chai thủy tinh nâu 30 ml, hộp 1 lọ.

- Để thuốc nơi khô, mát, tránh ánh sáng. **ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ