

12/144

MẪU NHÃN

Rx Thuốc bán theo đơn Lọ 10 ml

CHLORAMPHENICOL 0,5%

Thuốc nhỏ mắt

Thành phần: Mỗi lọ chứa
 Chloramphenicol 50 mg
 Tá dược vừa đủ 10 ml

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng, các thông tin khác: Xem toa bên trong hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C tránh ánh sáng

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Sản xuất tại:
Công ty CPDP Bidiphar 1
 498 Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, VN

Số lô SX/Lot No:
HD/Exp.date:

Không sử dụng quá 10 ngày sau khi mở nắp chai

Thành phần: Mỗi lọ chứa
 Chloramphenicol 50 mg
 Tá dược vừa đủ 10 ml

Chỉ định:
 Các nhiễm khuẩn ở mắt do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra: viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm mi mắt và viêm tuyến lệ

Cách dùng, liều dùng:
 Ngày nhỏ vào mắt mỗi lần 1-2 giọt, ngày 2-4 lần

Chống chỉ định, các thông tin khác:
 Xem toa hướng dẫn bên trong hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Số lô SX/Lot.No :
 Ngày SX/Mfg.Date:
 HD/Exp.Date :

Không sử dụng thuốc quá 10 ngày sau khi mở nắp chai


Sản xuất tại:
CÔNG TY CPDP BIDIPHAR 1
 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định, VN


Hộp 1 lọ x 10 ml

Rx Thuốc bán theo đơn

CHLORAMPHENICOL 0,5%

Thuốc nhỏ mắt





Composition: Each vial contains
 Chloramphenicol 50 mg
 Excipients q.s.to 10 ml

Indications:
 Ocular infections are caused by sensitive bacteria: blepharitis, conjunctivitis, dacryocystis, and keratitis.

Dosage, administration:
 Instill 1-2 drops into the conjunctival, 2-4 times daily.

Contraindications, other information:
 Read the leaflet in box
Storage: In cool dry place, temperature not exceed 30° C, protected from light.

Keep out of reach of children
Read carefully the leaflet before use

SDK/Reg.No :

Don't use drug more than 10 days after the vial is opened


Manufactured by:
Bidiphar 1 pharmaceutical JSC
 498 Nguyễn Thái Học Str., Quy Nhơn city
 Bình Định Prov., VN

Box of 1 vial 10 ml

Rx Prescription drug

CHLORAMPHENICOL 0.5%

Ophthalmic Solution



GMP WHO



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 4/3/14

CÔNG TY CPDP BIDIPHAR 1

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bà Thị Ngọc Quỳnh



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thuốc nhỏ mắt

CHLORAMPHENICOL 0,5%

Thành phần: Cho mỗi lọ 10 ml

Chloramphenicol 50 mg

Tá dược vđ 10 ml

(Tá dược: Natri borat, Acid boric, Trilon B, Natri clorid, Nipazin, nước cất pha tiêm)

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10 ml

Được lực học:

Chloramphenicol là kháng sinh kìm khuẩn, ức chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 50S của ribosom.

Chỉ dùng Chloramphenicol để điều trị những nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm, do Rickettsia, Chlamydia.

Được động học:

Chloramphenicol được hấp thu vào thủy dịch. Phân phối rộng rãi trong các mô và dịch thể kể cả mắt và hệ thần kinh trung ương, qua nhau thai và sữa mẹ. Hầu hết thuốc mất hoạt tính bởi Glucuronyl transferase. Đào thải qua thận phần lớn dạng không hoạt tính.

Chỉ định:

Trị các nhiễm khuẩn ở mắt do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra: viêm giác mạc, viêm kết mạc, viêm mí mắt, viêm tuyến lệ.

Liều dùng, cách dùng:

Nhỏ vào mắt mỗi lần 1 - 2 giọt, 2 - 4 lần / ngày.

Rửa tay sạch trước khi nhỏ thuốc.

Không để đầu lọ thuốc chạm vào mắt để tránh nhiễm bẩn. Nhỏ bỏ 1-2 giọt đầu trước khi nhỏ thuốc vào mắt.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với thuốc.

- Phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh.

Thận trọng:

Không nên dùng quá 10 ngày sau khi mở nắp chai.

Không nên mang kính áp tròng khi sử dụng.

Phải ngừng ngay liệu pháp chloramphenicol nếu xảy ra viêm dây thần kinh thị giác hoặc ngoại biên. Cũng như những kháng sinh khác, dùng chloramphenicol có thể dẫn đến sự sinh trưởng quá mức những vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả nấm. Nếu xảy ra bội nhiễm, phải tiến hành liệu pháp thích hợp.

Tương tác thuốc:

Tránh dùng phối hợp với 1 dạng thuốc tra mắt có kháng sinh hay Sulfamid.

Tác dụng không mong muốn:

Cảm giác xót, ngứa thoáng qua, vị đắng xuống miệng. Đôi khi xảy ra nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Rất hiếm khi xảy ra loạn sản máu, viêm dây thần kinh.

Thông báo cho Bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Có thể xảy ra tác dụng nhìn mờ, mắt nhạy cảm ánh sáng vì vậy không nên lái xe hay vận hành máy.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai không được dùng.

- Phụ nữ cho con bú dùng theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.

Sử dụng quá liều:

Nếu vô tình nhỏ quá liều nên lập tức rửa mắt bằng nước sạch và đến trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra xử lý.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Lọ thuốc đã mở không sử dụng quá 15 ngày.

- Nếu phát hiện thuốc có tủa đục, chuyển màu thì không được sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1

496 Nguyễn Thái Học - Quy Nhơn - Bình Định - Việt Nam

ĐT: 056.3846040 - FAX: 056.3846846



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Bà Thị Ngọc Quỳnh

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC