

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

MECTATHEPHARM



CÔNG THỨC: Cho 1 gói

Diosmectite		3 g
Tá dược	vđ	1 gói

(Tá dược gồm: Glucose, saccharin sodium, colloidal anhydrous silica, bột hương cam, vanilin)

TRÌNH BÀY: Hộp 30 gói x 4 gam

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Diosmectite là silicat nhôm và maginesi tự nhiên có cấu trúc từng lớp lá mỏng xếp song song với nhau và có độ quán đẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm mạc đường tiêu hóa. Diosmectite tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hóa nên làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác nhân lạ xâm hại. Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc tiêu hóa. Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ở ruột, nhưng đồng thời cũng có khả năng gắn vào các thuốc khác làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt tetracyclin và trimethoprim.

Diosmectite không cản quang, không làm phân biến màu và với liều thường dùng thuốc không làm thay đổi thời gian chuyển vận sinh lý các chất qua ruột.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Diosmectite không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa và bị thải trừ hoàn toàn theo phân.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.
- Ỉa chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn ỉa chảy kéo dài.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng chữa ỉa chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

• Trẻ em:

Dưới 1 tuổi: Ngày 1 gói chia 2 – 3 lần.

Từ 1 – 2 tuổi: Ngày 1 – 2 gói chia 2 – 3 lần.

Trên 2 tuổi: Ngày 2 – 3 gói chia 2 – 3 lần.

Hòa mỗi gói thuốc với khoảng 50 ml nước, trước mỗi lần dùng thuốc cần lắc hoặc khuấy đều. Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như nước canh, nước rau hoặc trộn kỹ với thức ăn nửa lỏng như món nghiền rau – quả.

• Người lớn:

Mỗi lần 1 gói, hòa với nửa cốc nước ấm, khuấy đều. Ngày 3 lần.

Trường hợp tiêu chảy cấp, liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.



Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác.

Riêng viêm loét trực tràng dùng cách thụt.

• *Thụt trực tràng:*

Mỗi lần 1 – 3 gói hòa với 50 – 100 ml nước ấm rồi thụt. Ngày 1 – 3 lần.

THẬN TRỌNG

- Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.

- Nếu ỉa chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa người bệnh và mức độ bị tiêu chảy. Cần thận trọng khi dùng diosmectite để điều trị ỉa chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong ỉa chảy cấp.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có chống chỉ định với phụ nữ thời kỳ mang thai và cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Rất hiếm trường hợp diosmectite gây táo bón hoặc làm nặng thêm mức độ táo bón đã có trước khi dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ TRÍ ADR

Cần giảm liều khi bị táo bón.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Diosmectite có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống diosmectite khoảng 2 – 3 giờ.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng: Dùng thuốc qua liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.

Xử trí: Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sĩ

Để xa tầm tay của trẻ em

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Nhà sản xuất và phân phối

CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 04 - Quang Trung - TP. Thanh hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3855.209



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Ngày 16 tháng 04 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trịnh Đăng Hùng

