

Mẫu nhãn hộp 1 tuýp : **Patylcrem**
Kích thước : 105 x 30 x 20 mm
Màu sắc : như mẫu

<https://nhathuocngocanh.com/>

389/138

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 18/01/2013

20 mm

105 mm

30 mm

Thành phần:
Clotrimazol 1%
Tá dược vd 1 tuýp
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn cơ sở
SDK-Reg. No.:

**Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng, Cách dùng,
Tương tác, Thận trọng, Tác dụng phụ:** Xin đọc hướng
dẫn sử dụng.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!**

Thuốc dùng ngoài

Patylcrem

Clotrimazol 1%

Hộp 1 tuýp 10g thuốc kem

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam



Composition:
Clotrimazole 1%
Excipients q.s. 1 tube

Store in a dry place, below 30°C. Protect from light.
Manufacturer's specification

**Indications, Dosage and Administration,
Contraindications, Interactions, Side effects and
other precautions:** Read carefully the enclosed leaflet.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE!**

For external use only

Patylcrem

Clotrimazole 1%

Box of 1 tube of 10g cream

HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD. Lot B, Dong An Industrial Park, Binh Duong Province, Vietnam



Số SX - Batch No.:
NSX - Mfg. Date:
HD - Exp. Date:



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS: Trần Đình Hương





Mẫu nhãn tuýp : **Patylcrem**

Kích thước : 80 x 55 mm

Màu sắc : như mẫu

<https://nhathuocngocanh.com/>



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hương



140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Patylcrem

Thuốc dùng ngoài

Thuốc kem

Thành phần

- Hoạt chất: Clotrimazol 1%.
- Tá dược: cetylalcol, cremophor A6, cremophor A25, paraffin lỏng, glycerin, propylen glycol, methyl paraben, propyl paraben, nước tinh khiết.

Dược lực học

- Clotrimazol là thuốc kháng nấm phổ rộng thuộc họ imidazol, được dùng điều trị các bệnh ngoài da do nhiễm các loại nấm gây bệnh khác nhau. Ngoài ra còn có tác dụng trên *Trichomonas*, *Staphylococcus*, *Bacteroides*.
- Cơ chế tác dụng của Clotrimazol là liên kết với các phospholipid của màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấm, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.

Dược động học

- Thuốc được phân bố dưới da dưới dạng không chuyển hóa, nồng độ giảm dần từ ngoài vào trong, nồng độ tối đa tại các lớp sừng hóa.
- Khi bôi trên da, Clotrimazol rất ít được hấp thu (chỉ khoảng 0,1 – 0,5% thuốc được hấp thu nhưng không tìm thấy trong huyết thanh).
- Lượng thuốc hấp thu được chuyển hóa ở gan rồi đào thải ra phân và nước tiểu.

Chỉ định

- Patylcrem được chỉ định để điều trị tại chỗ các bệnh nấm như:
- Nấm *Candida* ngoài da: Nấm kẽ giữa các ngón chân, ngón tay, nấm móng chân, móng tay, nấm lông tổ ong, nấm ben, âm hộ, đùi...
 - Hắc bào, lang ben, nước ăn chân do *Malassezia furfur*, viêm móng và quanh móng...

Liều dùng và cách dùng

- Dùng ngoài da: Bôi nhẹ một lượng thuốc vừa đủ lên vùng da bị bệnh, 2 lần/ngày. Thời gian điều trị trung bình từ 1 – 4 tuần, có khi đến 8 tuần.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng

- Không dùng Clotrimazol cho điều trị nấm toàn thân.
- Phải điều trị thuốc đúng thời gian chỉ định mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm.
- Chỉ dùng bôi ngoài da. Tránh để thuốc chạm mắt. Nếu có kích ứng hay nhạy cảm, phải ngưng dùng thuốc và thay bằng liệu pháp khác.

Tác dụng phụ

Có thể gặp một số ít trường hợp có những phản ứng tại chỗ như kích ứng, ngứa, đau rát sau khi bôi thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác

Chưa có báo cáo nào về tác dụng hiệp lực hay đối kháng giữa Clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay flucytosin với các loài *C. albicans*.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Chưa có đủ số liệu nghiên cứu trên phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Do đó chỉ được dùng khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ.
- Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người mẹ đang cho con bú.

Tác động khi vận hành máy móc, tàu xe

Chưa có đủ liệu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng vận hành máy móc, tàu xe.

Trình bày: Hộp 1 tuýp x tuýp 10 g thuốc kem. Tuýp nhôm.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS: *Trần Đình Hương*

