

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/06/2014

llh

5g

PhiTrenone


Mupirocin 100mg

Thành phần/composition:
 Mỗi tuýp 5g chứa/ Each tube 5g contains:
 Mupirocin.....100mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Indications, administration, contraindications:
 See insert paper

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số lô SX, HD sẽ dập trên tuýp



5g

Thuốc dùng ngoài

PhiTrenone

Mupirocin 100mg

Thành phần: Mỗi tuýp 5g chứa
 Mupirocin.....100mg
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát,
 tránh ánh sáng, dưới 30°C

Đóng gói: 5g/tuýp/hộp
 Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Sản xuất tại CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương
 SDK:

Số lô SX:
NSX:
HD:

5g

For topical use only

PhiTrenone

Mupirocin 100mg

Composition: Each tube 5g contains
 Mupirocin.....100mg
Dosage form: Topical ointment
Indications, administration, contraindications:
 See insert paper
Storage: In hermetic container, dry and cool
 place, protect from light, below 30°C

Package: 5g/tube/box
 Keep out of reach of children
 Read insert paper carefully before use
PHIL PHIL INTER PHARMA
 INTER PHARMA

WHO-GMP




10g

PhiTrenone

Mupirocin 200mg

Thành phần/composition:
 Mỗi tuýp 10g chứa/ Each tube 10g contains:
 Mupirocin.....200mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Indications, administration, contraindications:
 See insert paper

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số lô SX, HD sẽ dập trên tuýp



llh

10g Thuốc dùng ngoài

PhiTrenone

Mupirocin 200mg

PhiTrenone

Thành phần: Mỗi tuýp 10g chứa
 Mupirocin.....200mg
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát,
 tránh ánh sáng, dưới 30°C

Đóng gói: 10g/tuýp/hộp
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Sản xuất tại CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương
 SDK:

10g For topical use only

PhiTrenone

Mupirocin 200mg

PhiTrenone

Composition: Each tube 10g contains
 Mupirocin.....200mg
Dosage form: Topical ointment
Indications, administration, contraindications:
 See insert paper
Storage: In hermetic container, dry and cool
 place, protect from light, below 30°C

Package: 10g/tube/box
Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use

WHO-GMP

PHIL PHIL INTER PHARMA
 INTER PHARMA



TP. HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG



TC THANH HIỆU

*Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

PHITRENONE

SĐK:



THÀNH PHẦN

Hoạt chất:

- Tuýp 5g: Mupirocin100mg
- Tuýp 10g: Mupirocin 200mg

Tá dược: Polyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 4000, Edetate disodium, Nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc mỡ bôi da.

CHỈ ĐỊNH

PHITRENONE được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn da do vi khuẩn như: chốc lờ, viêm nang lông, nốt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Rửa sạch vùng cần bôi thuốc với nước sạch, bôi PHITRENONE lên vùng da bị bệnh 3 lần/ngày. Vùng da điều trị có thể được băng lại bằng một miếng gạc nếu cần thiết. Những bệnh nhân không có đáp ứng lâm sàng trong vòng 3 đến 5 ngày cần được đánh giá lại việc có nên tiếp tục dùng thuốc hay không.

Không trộn thuốc này với bất kỳ thuốc nào khác vì có thể dẫn đến giảm hoạt tính kháng khuẩn và mất tính ổn định của mupirocin trong thuốc mỡ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc này cho những bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không dùng PHITRENONE ở vùng mắt.

Khi dùng PHITRENONE, nếu có phản ứng mẫn cảm hoặc dị ứng xảy ra tại vùng điều trị nên ngưng điều trị, rửa sạch thuốc trên vùng da và tiến hành các biện pháp điều trị thích hợp.

Cũng như các thuốc kháng khuẩn khác, nếu sử dụng PHITRENONE lâu dài có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của các vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả nấm.

Tá dược là polyethylene glycol có thể được hấp thu từ các vết thương hở và da bị tổn thương và được bài tiết qua thận. Cũng như các thuốc mỡ chứa polyethylene glycol khác, PHITRENONE không nên sử dụng cho bệnh nhân trong trường hợp có thể xảy ra sự hấp thụ một lượng lớn polyethylene glycol, đặc biệt nếu bệnh nhân bị suy thận vừa hoặc nặng.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác khi sử dụng đồng thời PHITRENONE và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai:

Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật cho thấy không có bằng chứng về tác hại của thuốc cho thai nhi. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát khi dùng thuốc cho phụ nữ mang thai. Do các nghiên cứu trên động vật không thể giúp dự đoán được các phản ứng trên cơ thể người, nên thuốc chỉ được sử dụng cho phụ nữ có thai khi thật sự cần thiết.

Phụ nữ cho con bú:

Chưa biết được thuốc có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Do nhiều loại thuốc được bài tiết qua sữa mẹ, cần thận trọng khi sử dụng PHITRENONE cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn tại chỗ sau đã được báo cáo khi dùng thuốc mỡ mupirocin gồm: bỏng rát, cảm giác châm chích, đau xảy ra ở 1,5% số bệnh nhân, ngứa ở 1% số bệnh nhân, phát ban, buồn nôn, ban đỏ, khô da, nhạy cảm, sưng, viêm da tiếp xúc, và tăng tiết dịch ở ít hơn 1% bệnh nhân.

*** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

QUÁ LIỀU

Độc tính của mupirocin là rất thấp. Trường hợp không may nuốt phải thuốc, tiến hành điều trị triệu chứng.

Trường hợp vô tình nuốt một lượng lớn thuốc mỡ, cần theo dõi cẩn thận chức năng thận ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, do polyethylene glycol có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 5g.

Hộp 1 tuýp 10g.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

