

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 4/3/19

Keep out of reach of children
Carefully read the accompanying instructions before use

[Composition] Phẩm chứa: 12 viên nén / vỉ x 10 vỉ	[Precautions] Phải dùng thuốc này theo hướng dẫn của bác sĩ.
[Indications] Phải dùng thuốc này theo hướng dẫn của bác sĩ.	[Storage] Bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2-8°C.
[Dosage and administration] Phải dùng thuốc này theo hướng dẫn của bác sĩ.	[Specification] N - 105785
	[Shelf-life] 3 năm kể từ ngày 01/01/2019.

MLC



Các thông tin khác đề nghị xin trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Thành phần
Mỗi viên nén có chứa: Ginkgo biloba leaf extract ...40mg

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, lưu ý:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản
Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ phòng dưới 30°C

Visa No / SDK
Lot No / Số lô
Mfg date/ NSX
Exp date/ HSD
Xuất xứ: Hàn Quốc



SENRATIN
Tab.
(Ginkgobiloba 40mg)



*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ.*

SEN RATIN Tab.

Viên nén bao phim chứa cao khô lá Ginkgo biloba 40mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim SENRATIN Tab có chứa:

Hoạt chất: Cao khô lá Ginkgo biloba ... 40mg

Tá dược: Lactose, Tinh bột ngô, Cellulose vi tinh thể, Carboxymethylcellulose calci, Povidon, Talc, Magnesium stearate, HPMC 2910, PEG 6000, PG, Titan oxyd, Tá dược xanh số 1, Tá dược vàng số 203.

ĐƯỢC LỰC HỌC:

Chiết xuất của Ginkgo biloba (EGB) có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo tính chất, đường kính và nguồn gốc mô của mạch máu và tùy theo cả trương lực và tình trạng của thành mạch, kích thích sự tiết EDRF từ nội mô. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hòa độ giãn tĩnh mạch đáp ứng các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng cường sức bền mao mạch. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu-não và máu-võng mạc.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

Ở động vật, sau khi cho uống chất chiết xuất Ginkgo biloba có đánh dấu bằng C¹⁴ nghiên cứu về sự hấp thu và phân phối của sản phẩm cho thấy sự hấp thu EGB nhanh và hoàn toàn. Sự cân bằng phóng xạ vào 72h sau cho thấy sự thải ra trong CO₂ thở ra và trong nước tiểu. Đo phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số dược động học và cho thấy thời gian bán hủy sinh học khoảng 4h30. Định phóng xạ trong máu đạt được sau 1 giờ 30 cho thấy sự hấp thu xảy ra ở phần trên của đường tiêu hóa. Nghiên cứu về sự phân phối vào mô của phóng xạ cho thấy ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, hồi hải mã và thể vân.

CHỈ ĐỊNH: Ginkgo biloba được dùng để điều trị:

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên (hội chứng kẹp kiếng cách hồi).
- Các bệnh chóng mặt, ù tai do hệ mạch hoặc do thoái hóa
- Điều trị các rối loạn chức năng tự nhiên của não kèm theo các triệu chứng như ù tai, đau đầu, mất tập trung, trầm cảm

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Đối với các trường hợp rối loạn tuần hoàn ngoại biên, chóng mặt, ù tai: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày hoặc 2 viên/lần x 2 lần/ngày.

- Trong trường hợp rối loạn chức năng tự nhiên của não: uống 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày hoặc 3 viên/lần x 2 lần/ngày. Liều dùng và thời gian điều trị có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ và tình trạng của bệnh nhân. Tổ chức y tế cộng đồng khuyến cáo không sử dụng Ginkgo biloba đường uống cho trẻ. Vì vậy không dùng Ginkgo biloba cho trẻ dưới 12 tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ mang thai và cho con bú.
- Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu
- Trẻ em thiếu năng trí tuệ, người bị thần kinh phân lập

KHUYẾN CÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Nên ngưng dùng thuốc từ 36 giờ đến 14 ngày trước khi phẫu thuật. Đã có một báo cáo về trường hợp 1 người già sử dụng đồng thời ginkgo biloba kết hợp với một loại thuốc lợi tiểu dẫn đến tình trạng huyết áp tăng. Huyết áp sẽ trở lại trạng thái bình thường khi bệnh nhân ngưng dùng cả hai thuốc trên. Không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ ĐANG NUÔI CON BÚ

Do hiệu lực và độ an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được công bố, vì vậy không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thảo dược cũng có thể gây ra nguy cơ chảy máu nếu dùng đồng thời ginkgo biloba với tỏi, sâm, cỏ ba lá và các coumarin tự nhiên khác.

Không dùng phối hợp với thuốc cầm máu, thuốc chống đông.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

Nói chung ginkgo biloba được dung nạp tốt, tuy nhiên vẫn có một số tác dụng phụ xảy ra như nôn, mửa, tiêu chảy, đau đầu, hoa mắt, táo bón, suy nhược cơ thể, ốm yếu hay phát ban.

Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

QUÁ LIỀU: Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Nhà sản xuất

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ phòng dưới 30°C.

Đề xa tâm tay của trẻ nhỏ

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN NHÃN

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Sản xuất bởi:

SAMIK Pharmaceutical Co., Ltd.

374-1 Cheongcheon 1-Dong, Booyeong-Gu, Incheon, Hàn quốc.

R. G. S
Sung G. Ryu

SAMIK PHARMACEUTICAL CO., LTD.
374-1 Cheongcheon 1-Dong,
Booyeong-Gu, Incheon, Korea.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

