




MẪU NHÃN

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất :

a). Nhãn vỉ 15 viên nén bao phim.



2. Nhãn trung gian :

a). Nhãn hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim.

Handwritten signature

<p>THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa : - Eprazion dihydrochlorid 50 mg - Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim</p>		<p>CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.</p>	
<p>molitoux®</p> <p>SBK : TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG : TCOS REGISTRATION NUMBER : MANUFACTURER'S SPECIFICATION</p> <p>ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE</p> <p>CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JSC/STOCK CORP. 66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp 66 National Road 30 - Cao Lãnh City - Dong Thap Province (Achieved ISO 9001: 2008 certification)</p>		<p>COMPOSITION: Each film-coated tablet contains: - Eprazion dihydrochlorid 50 mg - Excipients s.q.f one film-coated tablet</p> <p>INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF ADMINISTRATION , CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package insert. STORAGE: At temperature below 30°C, protect from direct light.</p>	
<p>GMP - WHO</p> <p>molitoux® Eprazion dihydrochlorid 50 mg</p> <p> DOMESCO</p>		<p>2 vỉ x 15 viên nén bao phim 2 blisters x 15 film-coated tablets</p> <p>molitoux® Eprazion dihydrochlorid 50 mg</p>	

3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

MOLITOUX®

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa

- Eprazinon dihydrochlorid..... 50 mg
- Tá dược: Lactose khan, Avicel, Sodium starch glycolat, Talc, Magnesi stearat, Aerosil, Hydroxypropylmethyl cellulose 15cP, Hydroxypropylmethyl cellulose 6cP, Polyethylen glycol 6000, Talc, Titan dioxyd, màu Erythrosin lake.....vừa đủ 1 viên nén bao phim

* **Dạng bào chế:** Viên nén bao phim.

* **Qui cách đóng gói:**

- Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim.

* **Dược lực học:**

- Làm loãng đàm và long đàm do eprazinon gắn lên thụ thể receptor của mucin, giành chỗ không cho protein viêm gắn vào.

- Chữa ho.

- Làm dễ thở nhờ tác động chống co thắt phế quản.

* **Dược động học:**

- Ở người bình thường, hàm lượng eprazinon cao nhất trong huyết tương đạt được sau 1 giờ. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu qua gan. Thời gian bán thải khoảng 6 giờ.

* **Chỉ định:**

- Làm loãng đờm, long đờm để chữa ho, làm dễ thở: trong các trường hợp viêm phế quản cấp và mạn, viêm mũi họng kèm theo chứng nhiều đờm, đờm đặc.

* **Chống chỉ định:**

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ trong thời gian cho con bú.

* **Thận trọng:**

- Tiền sử co giật.

- Tiền sử mẫn cảm với thuốc.

* **Tương tác thuốc:**

- Không dùng chung với các thuốc giảm ho hoặc thuốc làm khô chất tiết phế quản do làm giảm tác dụng của thuốc.

- Không dùng chung eprazinon với các thuốc chuyển hóa qua gan do có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc eprazinon.

* **Tác dụng phụ:**

- Có thể gây rối loạn tiêu hóa.

- Hiếm khi gây ra dị ứng da, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt.

- Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* **Cách dùng - Liều dùng:** Dùng uống.

- Người lớn 3 – 6 viên/ngày, chia 3 lần.

- Thời gian điều trị: không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

* **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thời gian mang thai: thuốc chỉ được dùng trong lúc mang thai khi thực sự cần thiết, hỏi ý kiến bác sĩ nếu phát hiện mang thai trong lúc sử dụng.

- Thời kỳ nuôi con bú: không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

* **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

- Không dùng thuốc khi đang vận hành máy móc hay lái tàu xe.

* **Quá liều và xử trí**

- Nguy cơ gây co giật. Trong trường hợp quá liều, chủ yếu điều trị triệu chứng.

* **Khuyến cáo:**

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

- **Để xa tầm tay trẻ em.**

* **Bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn cơ sở.



Nơi sản xuất và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ : 66 - Quốc lộ 30 – Phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Điện thoại : (067) -3859370- 3852278



Huỳnh Trung Chánh