

MẶT SAU VÍ

MẶT TRƯỚC VÍ



air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

air-X120
 Simethicone 120 mg.
 CHÔNG ĐẦY HƠI
 Nhai 1 - 2 viên khi cần
 R.X.Manufacturing Co., Ltd/
 (Thái Lan)

I HÌNH | ƠN VỊ | ÔNG GỒI NHỎ NHẤT

Visa no. - So ĐK:
 B.No. - So lo SX:
 MFG. - NSX:
 EXP. - HD:

Handwritten signature

150/91-BS3



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

Viên nén nhai AIR-X 120 (Simethicon 120 mg)

Viên nén nhai, chữa đầy hơi và chướng bụng.
Các rối loạn tiêu hóa có xu hướng liên quan đến sự tích tụ quá nhiều hơi ở dạ dày ruột.
Các triệu chứng thông thường nhất là cảm giác bị ãp, căng và đầy thượng vị, ợ hơi, trung tiện.
AIR-X 120 giúp điều trị sự ứ hơi bất thường trong ống tiêu hóa.
Simethicon làm giảm sức căng bề mặt của các bóng hơi trong niêm mạc ống tiêu hóa, làm xẹp các bóng khí này, trợ giúp cho sự tổng hơi của ống tiêu hóa làm giảm chướng bụng. Simethicon là một chất không có độc tính, trơ về mặt hóa học và được dung nạp tốt vì vậy tiện dụng cho điều trị, ngăn ngừa những cảm giác khó chịu vì ứ hơi trong đường tiêu hóa và chướng bụng. Simethicon còn có tác dụng làm ngắn đi thời gian đi chuyển của hơi dọc theo ống tiêu hoá.

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén nhai chứa :
- Simethicon (USP 37)..... 120.00 mg
Tá dược: Colloidal silicon dioxyd (aerosil 200, aerosil R972), glucose khan, povidon, sucrose, dầu caraway, dầu fennel, dầu peppermint, menthol, calci stearat, nước tinh khiết.

MÔ TẢ: Viên nén nhai hình tròn, hai mặt cong, màu trắng.

CHỈ ĐỊNH:

Đầy hơi ở đường tiêu hóa, cảm giác bị ãp và căng ở vùng thượng vị, chướng bụng thoáng qua thường có sau bữa ăn thịnh soạn hoặc ăn nhiều chất ngọt, chướng bụng sau phẫu thuật; chuẩn bị chụp X-quang (đạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày.

LIỀU DÙNG:

Liều dùng thông thường là nhai kỹ 1 viên sau bữa ăn và trước khi đi ngủ, 3-4 lần/ngày.
Trong trường hợp chuẩn bị chụp X quang thì dùng 2 hoặc 3 ngày trước khi chụp. Liều dùng được điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.
- *Sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi -12 tuổi:* 120 mg Simethicon/ ngày, uống sau bữa ăn, chia làm 4 lần nên dùng dạng giọt. Nếu dùng dạng viên, dùng 1 viên 1 ngày.
- *Trẻ em dưới 2 tuổi không dùng dạng viên này.*

THẬN TRỌNG:

Không nên sử dụng quá 4 viên/ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Các trường hợp quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

AIR-X 120 làm giảm đáng kể triệu chứng và loại bỏ khí gây chứng đầy hơi. Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của AIR-X 120 là Simethicon, không được hấp thu vào dạ dày và ruột, do đó thường không có bất kỳ tác động gây hại nào cho cơ thể.

Cần thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU:

- Chưa có báo cáo nào về tác dụng gây hại của thuốc khi sử dụng quá liều, có lẽ là do tính chất trơ về mặt hóa học và không được hấp thu qua đường tiêu hóa của Simethicon.
- Tuy nhiên, nếu có triệu chứng bất thường khi dùng thuốc quá liều, hãy đến bệnh viện để được áp dụng các biện pháp giải độc thông thường và điều trị theo triệu chứng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tương tác thuốc nào giữa Air-X 120 với thuốc khác được báo cáo.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc có thể dùng trong thời kỳ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, không rõ thuốc có qua được nhau thai vào thai nhi hay bài tiết vào sữa hay không. Do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho người già, người suy gan, suy thận:

Do Simethicon không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa nên không gây ảnh hưởng gì đối với người già, người suy gan, suy thận.

TIÊU CHUẨN: USP 37.

HẠN DÙNG: 2 năm tính từ ngày sản xuất.

CẢNH BÁO: Không dùng thuốc này khi quá hạn dùng ghi trên bao bì đựng thuốc, khi thuốc đổi màu hay có mùi lạ.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐÓNG GÓI: 10 viên/vi; 10 vi/hộp.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ < 30°C.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT R.X.

76 Moo 10, đường Salaya-Bangpasi, Narapirom, Banglane, Nakornpathom 73130, Thái Lan
Điện thoại: 660-3429-8117-21 Fax: 660-3429-8117-21

Nhập khẩu bởi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP. Hồ Chí Minh-YTECO
181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 39330190; Fax: 39306909



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng